



Продукты Кемин для свиней и птицы

Наши продукты и услуги способствуют безопасному, здоровому и эффективному выращиванию животных

Для улучшения качества жизни людей и животных во всем мире компания Кемин соединяет глубокие знания в области молекулярной биологии и такие человеческие качества, как креативность, жажда знаний и взаимопомощь. Используя современные научные достижения, компания Кемин производит более 500 специальных добавок, которые повышают качество продуктов, потребляемых людьми и животными.



.....

В апреле 2017 года на территории ОЭЗ «Липецк» начал свою работу завод, соответствующий последним достижениям мировой науки и техники, который включает в себя производственный и административный комплекс, лаборатории и складские помещения, и является одним из самых высокотехнологичных заводов в портфеле компании Кемин.

Компания Кемин понимает необходимость выращивать здоровых животных, что позволит потребителям удовлетворить свои потребности в здоровом и полноценном питании, а животноводам сохранить производство прибыльным. Наши продукты и услуги способствуют безопасному, здоровому и эффективному выращиванию животных.

Компания Кемин разрабатывает решения в области липидного питания, ферментативных технологий, производства кормов, поддержания здоровой микрофлоры пищеварительного тракта, контроля микотоксинов, безопасности кормов, минерального питания и защищенных аминокислот, не разрушающихся в рубце. Все это способствует обеспечению безопасности всей пищевой цепи, улучшению питания животных путем более широкого применения кормовых добавок и улучшению здоровья сельскохозяйственных животных и птицы.



Обладея глубокими знаниями о продукте, техническими знаниями и навыками решения проблем, специалисты компании Кемин окажут оперативную поддержку в применении продуктов компании путем разработки оптимальных решений. Сотрудники **лабораторного сервиса для клиентов (CLS)** проводят специализированные лабораторные исследования, сотрудники **инженерно-технической службы (KAS)** предлагают клиентам рекомендации по оптимальному применению наших жидких продуктов.



Лабораторный
сервис для клиента



Инженерно-техническая
служба



Лабораторный сервис для клиентов

Лаборатория клиентского сервиса (CLS) была запущена в компании Кемин в 2014 году. Основная ее функция — контроль качества сырья и готовой продукции клиентов.

Микробиологический отдел производственной лаборатории лицензирован на работу с микроорганизмами III и IV групп патогенности. Кроме того, проводится комплексная оценка аминокислотного состава и одновременный количественный скрининг 17 наиболее важных аминокислот, анализируются органические кислоты, входящие в состав кормовых добавок и кормов, исследуется влажность образцов и их загрязненность микотоксинами. При этом одновременно в каждой пробе определяется до 8 различных микотоксинов.

В микробиологической лаборатории дается оценка загрязненности продуктов плесневыми грибами и дрожжами, энтеробактериями, кишечной палочкой, сальмонеллой и другими группами бактерий. По результатам исследований подбираются и рекомендуются необходимые ферменты для балансирования рационов и антиоксиданты или сорбенты для достижения безопасности кормов.



Инженерно-техническая служба

Инженерно-техническая поддержка (KAS) компании Кемин предоставляет специальную технологию по применению продуктов, сервис и проведение экспертизы для того, чтобы помочь нашим клиентам получить максимальную пользу от применения кормовых добавок, производимых компанией Кемин. Понимая, что все производственные предприятия отличаются друг от друга, и каждый заказчик преследует свои цели, инженеры и технические специалисты Кемин тесно сотрудничают с клиентами для разработки индивидуальных прикладных решений и контроля процессов и технологий.

Специалисты инженерно-технической службы проводят полевые исследования с использованием мобильных установок для гарантирования бесперебойной работы оборудования перед финальной установкой. После установки прикладной системы специалисты Кемин продолжают оказывать сервисную поддержку клиентам.

Компанией Кемин была разработана онлайн-технология, которая позволяет клиентам автоматизировать использование жидких продуктов Кемин. Специальное оборудование помогает снизить стоимость применения продукта, повысить техническую эффективность производства.



Содержание

Микроэлементы

КемТРЕЙС® пропионат хрома 0,4% сухой / KemTRACE® propionate Cr 0,4% dry	20
КемТРЕЙС® пропионат хрома 0,04% сухой / KemTRACE® propionate Cr 0,04% dry	22
КемТРЕЙС® пропионат цинка 27 сухой / KemTRACE® Zinc propionate 27 dry	24

Ферменты

КЕМЗАЙМ® Экстенд сухой / KEMZYME® Extend dry	26
КЕМЗАЙМ® XPF сухой / KEMZYME® XPF dry	28
КЕМЗАЙМ® MAP сухой / KEMZYME® MAP dry	30
КЕМЗАЙМ® Плюс Р сухой / KEMZYME® Plus P dry	32
КЕМЗАЙМ® Плюс Р жидкий / KEMZYME® Plus P liquid	34
КЕМЗАЙМ® Плюс сухой / KEMZYME® PLUS dry	36
КЕМЗАЙМ® W сухой / KEMZYME® W dry	38
КЕМЗАЙМ® W жидкий / KEMZYME® W liquid	40
КЕМЗАЙМ® W концентрированный сухой / KEMZYME® W concentrated dry	42
КЕМЗАЙМ® X PRO сухой / KEMZYME® X PRO dry	44
КЕМЗАЙМ® Протеаза / KEMZYME® Protease dry	46
Ксайджест НТ 2D сухой / Xygest HT 2D dry	48
Ксайджест НТ 20D сухой / Xygest HT 20D dry	50
НУТРИКЕМ сухой / NUTRIKEM dry	52

Биосурфактант (эмульгатор)

ЛИСОФОРТ® Бустер сухой / LYSOFORTE® Booster dry	54
ЛИСОФОРТ® ЭКСТЕНД сухой / LYSOFORTE® EXTEND dry	56

Ароматические добавки

Масло Ванильный Аромат сухой / Butter Vanilla Arome dry	58
---	----

Анионовые соли

НутриКАБ / NutriCAB	60
---------------------	----

Поддержка здоровья ЖКТ

БутиПЕРЛ® / ButiPEARL®	62
------------------------	----

Подкислители

АСИД ЛАК® ХТ сухой / ACID LAC® XT dry	64
АСИД ЛАК® сухой / ACID LAC® dry	66

Пробиотическая добавка

КЛОСТАТ® сухой / CLOSTAT® dry	68
КЛОСТАТ® НС SP сухой / CLOSTAT® НС SP dry	70
ЭНТЕРОШУР / ENTEROSURE	72

Поддержка иммунитета

АЛИТА / ALETA	74
АЛИТА D / ALETA D	76

Антиоксидант

РЕНДОКС ПЛЮС жидкий / RENDOX PLUS liquid	78
Термокс® сухой FG / Termox® dry FG	80
Термокс® жидкий FG / Termox® liquid FG	82
ЭНДОКС® Д сухой / ENDOX® D dry	84
ЭНДОКС® МЕ сухой / ENDOX® ME dry	86
Парадаймокс Уайт жидкий / Paradigmox White liquid	88
Парадаймокс Уайт сухой / Paradigmox White dry	90
Парадаймокс Уайт DN сухой / Paradigmox White DN dry	92

Противомикробная добавка

ФормаКСОЛ® / FormaXOL®	94
Формил® 2В сухой / Formyl® 2B dry	96

Безопасность сырья и кормов

Мико КАРБ® сухой / Myco CURB® dry	98
Мико КАРБ® жидкий / Myco CURB® liquid	100
Сал КАРБ® сухой / Sal CURB® dry	102
Сал КАРБ® K2 сухой / Sal CURB® K2 dry	104
Сал КАРБ® K2 жидкий / Sal CURB® K2 liquid	106
Сал КАРБ® Ba жидкий / Sal CURB® Ba liquid	108
Сал КАРБ® жидкий / Sal CURB® liquid	110
КЕМ ВЕТ Амп жидкий / KEM WET Amp liquid	112
ПроОксайн АН / ProOxine АН	114

Адсорбенты микотоксинов

ТОКСФИН сухой / TOXFIN dry	116
ТОКСФИН 2.0 сухой / TOXFIN 2.0 dry	118
ТОКСФИН XL сухой / TOXFIN XL dry	120



Алфавитный указатель

■ АЛИТА / ALETA	74
■ АЛИТА D / ALETA D	76
■ АСИД ЛАК® сухой / ACID LAC® dry	66
■ АСИД ЛАК® ХТ сухой / ACID LAC® ХТ dry	64
■ БутиПЕРЛ® / ButiPEARL®	62
■ КЕМ ВЕТ Амп жидкий / KEM WET Amp liquid	112
■ КЕМЗАЙМ® MAP сухой / KEMZYME® MAP dry	30
■ КЕМЗАЙМ® Плюс Р жидкий / KEMZYME® Plus P liquid	34
■ КЕМЗАЙМ® Плюс Р сухой / KEMZYME® Plus P dry	32
■ КЕМЗАЙМ® Плюс сухой / KEMZYME® PLUS dry	36
■ КЕМЗАЙМ® Протеаза / KEMZYME® Protease dry	46
■ КЕМЗАЙМ® Экстенд сухой / KEMZYME® Extend dry	26
■ КЕМЗАЙМ® Х PRO сухой / KEMZYME® Х PRO dry	44
■ КЕМЗАЙМ® XPF сухой / KEMZYME® XPF dry	28
■ КЕМЗАЙМ® W жидкий / KEMZYME® W liquid	40
■ КЕМЗАЙМ® W концентрированный сухой / KEMZYME® W concentrated dry	42
■ КЕМЗАЙМ® W сухой / KEMZYME® W dry	38
■ КемТРЕЙС® пропионат хрома 0,4% сухой / KemTRACE® propionate Cr 0,4% dry	20
■ КемТРЕЙС® пропионат хрома 0,04% сухой / KemTRACE® propionate Cr 0,04% dry	22
■ КемТРЕЙС® пропионат цинка 27 сухой / KemTRACE® Zinc propionate 27 dry	24
■ КЛОСТАТ® сухой / CLOSTAT® dry	68
■ КЛОСТАТ® HC SP сухой / CLOSTAT® HC SP dry	70
■ Ксайджест HT 2D сухой / Xygest HT 2D dry	48
■ Ксайджест HT 20D сухой / Xygest HT 20D dry	50
■ ЛИСОФОРТ® Бустер сухой / LYSOFORTE® Booster dry	54

■ ЛИСОФОРТ® ЭКСТЕНД сухой / LYSOFORTE® EXTEND dry	56
■ Масло Ванильный Аромат сухой / Butter Vanilla Arome dry	58
■ Мико КАРБ® жидкий / Myco CURB® liquid	100
■ Мико КАРБ® сухой / Myco CURB® dry	98
■ НутриКАБ / NutriCAB	60
■ НУТРИКЕМ сухой / NUTRIKEM dry	52
■ Парадаймокс Уайт жидкий / Paradigmox White liquid	88
■ Парадаймокс Уайт сухой / Paradigmox White dry	90
■ Парадаймокс Уайт DN сухой / Paradigmox White DN dry	92
■ ПроОксайн АН / ProOxine АН	114
■ РЕНДОКС ПЛЮС жидкий / RENDOX PLUS liquid	78
■ Сал КАРБ® жидкий / Sal CURB® liquid	110
■ Сал КАРБ® K2 жидкий / Sal CURB® K2 liquid	106
■ Сал КАРБ® K2 сухой / Sal CURB® K2 dry	104
■ Сал КАРБ® Ва жидкий / Sal CURB® Ba liquid	108
■ Сал КАРБ® сухой / Sal CURB® dry	102
■ Термокс® жидкий FG / Termox® liquid FG	82
■ Термокс® сухой FG / Termox® dry FG	80
■ ТОКСФИН сухой / TOXFIN dry	116
■ ТОКСФИН 2.0 сухой / TOXFIN 2.0 dry	118
■ ТОКСФИН XL сухой / TOXFIN XL dry	120
■ ФормаКСОЛ® / FormaXOL®	94
■ Формил® 2B сухой / Formyl® 2B dry	96
■ ЭНДОКС® Д сухой / ENDOX® D dry	84
■ ЭНДОКС® МЕ сухой / ENDOX® ME dry	86
■ ЭНТЕРОШУР / ENTEROSURE	72

■ эффективность ■ здоровье ■ безопасность



Содержание для каждого вида животных



Бройлеры / индейки

Микроэлементы

КемТРЕЙС® пропионат Cr 0,4% сухой / KemTRACE® propionate Cr 0,4% dry	20
КемТРЕЙС® пропионат Cr 0,04% сухой / KemTRACE® propionate Cr 0,04% dry	22
КемТРЕЙС® пропионат цинка 27 сухой / KemTRACE® brand Zinc Propionate 27 dry	24

Ферменты

КЕМЗАЙМ® Экстенд сухой / KEMZYME® Extend dry	26
КЕМЗАЙМ® XPF сухой / KEMZYME® XPF dry	28
КЕМЗАЙМ® MAP сухой / KEMZYME® MAP dry	30
КЕМЗАЙМ® Плюс Р сухой / KEMZYME® Plus P dry	32
КЕМЗАЙМ® Плюс Р жидкий / KEMZYME® Plus P liquid	34
КЕМЗАЙМ® Плюс сухой / KEMZYME® PLUS dry	36
КЕМЗАЙМ® W сухой / KEMZYME® W dry	38
КЕМЗАЙМ® W жидкий / KEMZYME® W liquid	40
КЕМЗАЙМ® W концентрированный сухой / KEMZYME® W concentrated dry	42
КЕМЗАЙМ® X PRO сухой / KEMZYME® X PRO dry	44
КЕМЗАЙМ® Протеаза / KEMZYME® Protease dry	46
Ксайджест НТ 2D сухой / Xygest HT 2D dry	48
Ксайджест НТ 20D сухой / Xygest HT 20D dry	50
НУТРИКЕМ сухой / NUTRIKEM dry	52

Биосурфактант (эмульгатор)

ЛИСОФОРТ® Бустер сухой / LYISOFORTE® Booster dry	54
ЛИСОФОРТ® ЭКСТЕНД сухой / LYISOFORTE® EXTEND dry	56

Ароматические добавки

Масло Ванильный Аромат сухой / Butter Vanilla Arome dry	58
---	----

Поддержка здоровья ЖКТ

БутиПЕРЛ® / ButiPEARL®	62
------------------------	----

Подкислители

АСИД ЛАК® ХТ сухой / ACID LAC® XT dry	64
АСИД ЛАК® сухой / ACID LAC® dry	66

Пробиотическая добавка

КЛОСТАТ® сухой / CLOSTAT® dry	68
КЛОСТАТ® НС SP сухой / CLOSTAT® НС SP dry	70
ЭНТЕРОШУР / ENTEROSURE	72

Поддержка иммунитета

АЛИТА / ALETA	74
АЛИТА D / ALETA D	76

Антиоксидант

РЕНДОКС ПЛЮС жидкий / RENDOX PLUS liquid	78
Термокс® сухой FG / Termox® dry FG	80
Термокс® жидкий FG / Termox® liquid FG	82
ЭНДОКС® Д сухой / ENDOX® D dry	84
ЭНДОКС® МЕ сухой / ENDOX® ME dry	86
Парадаймокс Уайт жидкий / Paradigmoх White liquid	88
Парадаймокс Уайт сухой / Paradigmoх White dry	90
Парадаймокс Уайт DN сухой / Paradigmoх White DN dry	92

Противомикробная добавка

ФормаКСОЛ® / FormaXOL®	94
Формил® 2В сухой / Formyl® 2B dry	96

Безопасность сырья и кормов

Мико КАРБ® сухой / Myco CURB® dry	98
Мико КАРБ® жидкий / Myco CURB® liquid	100
Сал КАРБ® сухой / Sal CURB® dry	102
Сал КАРБ® K2 сухой / Sal CURB® K2 dry	104
Сал КАРБ® K2 жидкий / Sal CURB® K2 liquid	106
Сал КАРБ® Ва жидкий / Sal CURB® Ba liquid	108
Сал КАРБ® жидкий / Sal CURB® liquid	110
КЕМ ВЕТ Амп жидкий / KEM WET Amp liquid	112
ПроОксайн АН / ProOxine АН	114

Адсорбенты микотоксинов

ТОКСФИН сухой / TOXFIN dry	116
ТОКСФИН 2.0 сухой / TOXFIN 2.0 dry	118
ТОКСФИН XL сухой / TOXFIN XL dry	120



Свиньи

Микроэлементы

КемТРЕЙС® пропионат Cr 0,4% сухо / KemTRACE® propionate Cr 0,4% dry	20
КемТРЕЙС® пропионат Cr 0,04% сухой / KemTRACE® propionate Cr 0,04% dry	22
КемТРЕЙС® пропионат цинка 27 сухой / KemTRACE® brand Zinc Propionate 27 dry	24

Ферменты

КЕМЗАЙМ® Экстенд сухой / KEMZYME® Extend dry	26
КЕМЗАЙМ® XPF сухой / KEMZYME® XPF dry	28
КЕМЗАЙМ® МАР сухой / KEMZYME® MAP dry	30
КЕМЗАЙМ® Плюс Р сухой / KEMZYME® Plus P dry	32
КЕМЗАЙМ® Плюс Р жидкий / KEMZYME® Plus P liquid	34
КЕМЗАЙМ® Плюс сухой / KEMZYME® PLUS dry	36
КЕМЗАЙМ® W сухой / KEMZYME® W dry	38
КЕМЗАЙМ® W жидкий / KEMZYME® W liquid	40
КЕМЗАЙМ® W концентрированный сухой / KEMZYME® W concentrated dry	42
КЕМЗАЙМ® X PRO сухой / KEMZYME® X PRO dry	44
КЕМЗАЙМ® Протеаза / KEMZYME® Protease dry	46
Ксайджест НТ 2D сухой / Xygest HT 2D dry	48
Ксайджест НТ 20D сухой / Xygest HT 20D dry	50
НУТРИКЕМ сухой / NUTRIKEM dry	52

Биосурфактант (эмульгатор)

ЛИСОФОРТ® Бустер сухой / LYSOFORTE® Booster dry	54
ЛИСОФОРТ® ЭКСТЕНД сухой / LYSOFORTE® EXTEND dry	56

Ароматические добавки

Масло Ванильный Аромат сухой / Butter Vanilla Arome dry	58
---	----

Анионовые соли

НутриКАБ / NutriCAB	60
---------------------	----

Поддержка здоровья ЖКТ

БутиПЕРЛ® / ButiPEARL®	62
------------------------	----

Подкислители

АСИД ЛАК® ХТ сухой / ACID LAC® XT dry	64
АСИД ЛАК® сухой / ACID LAC® dry	66

Пробиотическая добавка

КЛОСТАТ® сухой / CLOSTAT® dry	68
КЛОСТАТ® HC SP сухой / CLOSTAT® HC SP dry	70
ЭНТЕРОШУР / ENTEROSURE	72

Поддержка иммунитета

АЛИТА / ALETA	74
АЛИТА D / ALETA D	76

Антиоксидант

РЕНДОКС ПЛЮС жидкий / RENDOX PLUS liquid	78
Термокс® сухой FG / Termox® dry FG	80
Термокс® жидкий FG / Termox® liquid FG	82
ЭНДОКС® Д сухой / ENDOX® D dry	84
ЭНДОКС® МЕ сухой / ENDOX® ME dry	86
Парадаймокс Уайт жидкий / Paradigmoх White liquid	88
Парадаймокс Уайт сухой / Paradigmoх White dry	90
Парадаймокс Уайт DN сухой / Paradigmoх White DN dry	92

Противомикробная добавка

ФормаКСОЛ® / FormaXOL®	94
Формил® 2B сухой / Formyl® 2B dry	96

Безопасность сырья и кормов

Мико КАРБ® сухой / Myco CURB® dry	98
Мико КАРБ® жидкий / Myco CURB® liquid	100
Сал КАРБ® сухой / Sal CURB® dry	102
Сал КАРБ® K2 сухой / Sal CURB® K2 dry	104
Сал КАРБ® K2 жидкий / Sal CURB® K2 liquid	106
Сал КАРБ® Ba жидкий / Sal CURB® Ba liquid	108
Сал КАРБ® жидкий / Sal CURB® liquid	110
КЕМ ВЕТ Амп жидкий / KEM WET Amp liquid	112
ПроОксайн АН / ProOxine АН	114

Адсорбенты микотоксинов

ТОКСФИН сухой / TOXFIN dry	116
ТОКСФИН 2.0 сухой / TOXFIN 2.0 dry	118
ТОКСФИН XL сухой / TOXFIN XL dry	120



Куры несушки

Микроэлементы

КемТРЕЙС® пропионат хрома 0,4% сухой / KemTRACE® propionate Cr 0,4% dry	20
КемТРЕЙС® пропионат хрома 0,04% сухой / KemTRACE® propionate Cr 0,04% dry	22
КемТРЕЙС® пропионат цинка 27 сухой / KemTRACE® brand Zinc Propionate 27 dry	24

Ферменты

КЕМЗАЙМ® Экстенд сухой / KEMZYME® Extend dry	26
КЕМЗАЙМ® XPF сухой / KEMZYME® XPF dry	28
КЕМЗАЙМ® МАР сухой / KEMZYME® MAP dry	30
КЕМЗАЙМ® Плюс Р сухой / KEMZYME® Plus P dry	32
КЕМЗАЙМ® Плюс Р жидкий / KEMZYME® Plus P liquid	34
КЕМЗАЙМ® Плюс сухой / KEMZYME® PLUS dry	36
КЕМЗАЙМ® W сухой / KEMZYME® W dry	38
КЕМЗАЙМ® W жидкий / KEMZYME® W liquid	40
КЕМЗАЙМ® W концентрированный сухой / KEMZYME® W concentrated dry	42
КЕМЗАЙМ® X PRO сухой / KEMZYME® X PRO dry	44
КЕМЗАЙМ® Протеаза / KEMZYME® Protease dry	46
Ксайджест НТ 2D сухой / Xygest HT 2D dry	48
Ксайджест НТ 20D сухой / Xygest HT 20D dry	50
НУТРИКЕМ сухой / NUTRIKEM dry	52

Биосурфактант (эмульгатор)

ЛИСОФОРТ® Бустер сухой / LYISOFORTE® Booster dry	54
ЛИСОФОРТ® ЭКСТЕНД сухой / LYISOFORTE® EXTEND dry	56

Ароматические добавки

Масло Ванильный Аромат сухой / Butter Vanilla Arome dry	68
---	----

Поддержка здоровья ЖКТ

БутиПЕРЛ® / ButiPEARL®	62
------------------------	----

Подкислители

АСИД ЛАК® ХТ сухой / ACID LAC® XT dry	64
АСИД ЛАК® сухой / ACID LAC® dry	66

Пробиотическая добавка

КЛОСТАТ® сухой / CLOSTAT® dry	68
КЛОСТАТ® НС SP сухой / CLOSTAT® НС SP dry	70
ЭНТЕРОШУР / ENTEROSURE	72

Поддержка иммунитета

АЛИТА / ALETA	74
АЛИТА D / ALETA D	76

Антиоксидант

РЕНДОКС ПЛЮС жидкий / RENDOX PLUS liquid	78
Термокс® сухой FG / Termox® dry FG	80
Термокс® жидкий FG / Termox® liquid FG	82
ЭНДОКС® Д сухой / ENDOX® D dry	84
ЭНДОКС® МЕ сухой / ENDOX® ME dry	86
Парадаймокс Уайт жидкий / Paradigmox White liquid	88
Парадаймокс Уайт сухой / Paradigmox White dry	90
Парадаймокс Уайт DN сухой / Paradigmox White DN dry	92

Противомикробная добавка

ФормаКСОЛ® / FormaXOL®	94
Формил® 2В сухой / Formyl® 2B dry	96

Безопасность сырья и кормов

Мико КАРБ® сухой / Мусо CURB® dry	98
Мико КАРБ® жидкий / Мусо CURB® liquid	100
Сал КАРБ® сухой / Sal CURB® dry	102
Сал КАРБ® К2 сухой / Sal CURB® К2 dry	104
Сал КАРБ® К2 жидкий / Sal CURB® К2 liquid	106
Сал КАРБ® Ва жидкий / Sal CURB® Ba liquid	108
Сал КАРБ® жидкий / Sal CURB® liquid	110
КЕМ ВЕТ Амп жидкий / KEM WET Amp liquid	112
ПроОксайн АН / ProOxine АН	114

Адсорбенты микотоксинов

ТОКСФИН сухой / TOXFIN dry	116
ТОКСФИН 2.0 сухой / TOXFIN 2.0 dry	118
ТОКСФИН XL сухой / TOXFIN XL dry	120



Микроэлементы



КемТРЕЙС® пропионат хрома 0,4% сухой KemTRACE® propionate Cr 0,4%



КемТРЕЙС® пропионат хрома 0,4% сухой – кормовая добавка для восполнения метаболического дефицита хрома у крупного рогатого скота, свиней и сельскохозяйственной птицы с целью нормализации углеводного обмена.



Характеристики

- Безопасный источник хрома, разрешенный к использованию в кормах для сельскохозяйственных животных.
- Наиболее эффективен при применении в транзитный период у коров и в период отъема/перегруппировки у молодняка, а также при тепловом стрессе у всех животных. Кроме того, может использоваться в период интенсивного зернового откорма мясного скота.
- Работает вне зависимости от состава рациона.



Действующие вещества

Пропионат хрома, пропионовая кислота, пропиленгликоль, вазелиновое масло.



Биологические свойства

- КемТРЕЙС® пропионат хрома 0,4% сухой является источником хрома, который играет важную роль в энергетическом обмене, в частности, участвует в контроле рецепторов инсулина и обмене глюкозы.
- В результате использования добавки КемТРЕЙС® пропионат хрома 0,4% сухой в кормах улучшается здоровье, продуктивность, рост и воспроизводительные качества животных, а также эффективность использования корма.
- Не теряет активности после термической обработки корма.



Порядок применения

- Норма ввода для свиней и сельскохозяйственной птицы – 200 мг/т кормбикорма в пересчете на элементарный хром.
- Для молодняка крупного рогатого скота норма ввода в концентрат или минерально-витаминный премикс 0,3 мг элементарного хрома на 1 кг сухого вещества рациона.
- Для молочных коров норма ввода в концентрат или минерально-витаминный премикс 10 мг элементарного хрома на голову в день.



Хранение

- Хранить в упаковке производителя в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте при температуре от 0 °С до 30 °С.
- Срок хранения – 24 месяца со дня изготовления.



Упаковка

КемТРЕЙС® пропионат хрома 0,4% сухой выпускают расфасованным по 25 кг во влагонепроницаемые бумажные мешки с полимерным напылением.

Микроэлементы



КемТРЕЙС® пропионат хрома 0,04% сухой KemTRACE® propionate Cr 0,04%



КемТРЕЙС® пропионат хрома 0,04% сухой – кормовая добавка для восполнения метаболического дефицита хрома у крупного рогатого скота, свиней и сельскохозяйственной птицы с целью нормализации углеводного обмена.



Характеристики

- Безопасный источник хрома, разрешённый к использованию в кормах для сельскохозяйственных животных.
- Наиболее эффективен при применении в транзитный период у коров и в период отъёма/перегруппировки у молодняка, а также при тепловом стрессе у всех животных. Кроме того, может использоваться в период интенсивного зернового откорма мясного скота.
- Работает вне зависимости от состава рациона.



Действующие вещества

Пропионат хрома, пропионовая кислота.



Хранение

- Хранят в упаковке производителя в сухом, защищенном от солнечных лучей месте, при температуре от 0 °C до 30 °C.
- Срок хранения — 24 месяца со дня изготовления.



Биологические свойства

- КемТРЕЙС® пропионат хрома 0,04% сухой является источником хрома, который играет важную роль в энергетическом обмене, в частности, участвует в контроле рецепторов инсулина и обмене глюкозы.
- В результате использования добавки улучшается здоровье, продуктивность, рост и воспроизводительные качества животных, в том числе птиц, а также эффективность использования корма.
- Не теряет активности после термической обработки корма.



Порядок применения

- Вводят в концентраты и корма на комбикормовых заводах или в кормоцехах хозяйств, используя существующие технологии ступенчатого смешивания.
- Норма ввода для свиней и сельскохозяйственных птиц составляет 200 мг/тону комбикорма в пересчете на элементарный хром. Для обеспечения данной нормы ввода добавку вносят непосредственно в комбикорм или концентрат в количестве — 500 г/тону.
- Для молодняка крупного рогатого скота и мясного скота добавку вносят в комбикорма или концентрат из расчета 0,3 мг элементарного хрома на 1 кг сухого вещества рациона. Для обеспечения данной нормы ввода добавку вносят непосредственно в комбикорм или концентрат в количестве — 0,75 г на 1 кг сухого вещества рациона.
- Для молочных коров добавку вносят в комбикорм из расчета 10 мг элементарного хрома на голову в день. Для обеспечения данной нормы ввода добавку вносят непосредственно в комбикорм в количестве — 25 г на голову в день.



Упаковка

Выпускают расфасованным по 1 и 5 кг в полимерные контейнеры, по 10, 15, 20 и 25 кг во влагонепроницаемые бумажные мешки с полимерным напылением или многослойные бумажные мешки с полиэтиленовым вкладышем или по 500 и 1000 кг в биг-бэги.

Микроэлементы



КемТРЕЙС® пропионат цинка 27 сухой KemTRACE® Zinc Propionate 27 dry



КемТРЕЙС® пропионат цинка 27 сухой – кормовая добавка для обогащения и балансирования рационов крупного и мелкого рогатого скота и сельскохозяйственной птицы по цинку.



Характеристики

- Содержит минимум 27% цинка в форме пропионата.
- Лучше усваивается и удерживается в организме по сравнению с неорганическими и некоторыми органическими источниками.
- Пропионаты металлов, включая цинк, могут улучшить показатели продуктивности животных и эффективность использования кормов.



Действующие вещества

Цинк.



Хранение

- Хранят в упаковке производителя в сухом, защищенном от солнечных лучей месте, при температуре от 0°C до 30°C.
- Срок хранения – 24 месяца со дня изготовления.



Биологические свойства

- КемТРЕЙС® пропионат цинка 27 сухой содержит комплекс цинка с пропионовой кислотой, который обладает более высокой биологической доступностью по сравнению с неорганическими источниками цинка.
- Цинк необходим для формирования костей, стимулирования обмена углеводов и белков, активации действия гормонов, ферментных систем, поддержания иммунной системы и репродуктивной функции.
- В результате использования добавки нормализуется общее состояние и продуктивность животных, в том числе птиц, а также эффективность использования корма.



Порядок применения

- Для мелкого рогатого скота (ягнята): 20 мг/кг корма в пересчете на цинк. Добавку вносят непосредственно в комбикорма или премиксы в количестве 0,074 г/кг корма.
- Бычки мясных пород: 25 мг/кг корма в пересчете на цинк. Добавку вносят непосредственно в комбикорма или премиксы в количестве 0,093 г/кг корма.
- Для дойных пород коров: 75 мг/кг корма в пересчете на цинк. Добавку вносят непосредственно в комбикорма или премиксы в количестве 0,28 г/кг корма или 1,3 г/голову в день.
- Для индейки: 15-45 мг/кг корма в пересчете на цинк. Добавку вносят непосредственно в комбикорма или премиксы в количестве 0,055-0,167 г/кг корма.
- Для кур-несушек и бройлеров: 10-20 мг/кг корма в пересчете на цинк. Добавку вносят непосредственно в комбикорма или премиксы в количестве 0,037-0,074 г/кг корма.



Упаковка

Выпускают расфасованным по 1 и 5 кг в полимерные контейнеры, по 10, 15, 20 и 25 кг во влагонепроницаемые бумажные мешки с полимерным напылением или многослойные бумажные мешки с полиэтиленовым вкладышем средней плотности или по 500 и 1000 кг в биг-бэги.

Ферменты



КЕМЗАЙМ® Экстенд сухой KEMZYME® Extend dry



КЕМЗАЙМ® Экстенд сухой – кормовая добавка для повышения перевариваемости питательных веществ в рационах свиней и сельскохозяйственной птицы.



Характеристики

- Термостабильная ксиланаза, характеризующаяся высокой активностью и выдерживающая температуру гранулирования до 95 °С.
- Нанесена на активный носитель.
- Может использоваться в рассыпных и гранулированных комбикормах.



Действующие вещества

Ксиланаза, лецитин.



Биологические свойства

- Ксиланаза, основной компонент кормовой добавки КЕМЗАЙМ® Экстенд сухой, является ферментом, который расщепляет в кишечнике животных некрахмальные полисахариды, в первую очередь ксиланы (пентозаны), а также бета-глюканы и целлюлозу, тем самым улучшает переваривание и усвоение питательных веществ кормов – углеводов, жиров, аминокислот и минералов.
- В результате использования добавки КЕМЗАЙМ® Экстенд сухой нормализуется обмен веществ и повышается рост и продуктивность свиней и сельскохозяйственной птицы.



Порядок применения

- Норма ввода для бройлеров, цыплят на откорме составляет 500 г/т комбикорма.
- Норма ввода для индейки на откорме, индейки для разведения 1000 г/т.
- Норма ввода для кур-несушек, свиней на откорме, поросят-отъемышей 1500 г/т.



Хранение

- Хранить в упаковке производителя в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте при температуре от 0 °С до 30 °С.
- Срок хранения – 12 месяцев со дня изготовления.



Упаковка

КЕМЗАЙМ® Экстенд сухой выпускают расфасованным по 1 или 5 кг в полимерные контейнеры, по 10, 15, 20, 25 кг во влагонепроницаемые бумажные мешки с полимерным напылением или с полиэтиленовым вкладышем.

Ферменты



КЕМЗАЙМ® XPF сухой KEMZYME® XPF dry



КЕМЗАЙМ® XPF сухой – кормовая добавка для повышения переваримости питательных веществ в рационах сельскохозяйственной птицы на основе пшеницы, кукурузы, ржи, тритикале, ячменя, овса, шротов и жмыхов.

Характеристики

- Специальная комбинация ферментов, содержащая медленно высвобождаемую амилазу с защитой от кислой среды для улучшения расщепления крахмала, а также нерастворимые полисахаридные гидролазы (целлюлаза, ксиланаза и глюканаза) и эстеразу феруловой кислоты (XPF) для расщепления некрахмалистых полисахаридов (НПС).
- Улучшенная технология хранения обеспечивает необходимую активность и эффективность ферментов.

Действующие вещества

β-глюканаза, целлюлаза, амилаза, ксиланаза, эстераза феруловой кислоты.



Биологические свойства

- КЕМЗАЙМ® XPF сухой содержит ферменты, которые расщепляют в кишечнике животных некрахмальные полисахариды (пентозаны, бета-глюканы, целлюлозу), тем самым улучшается переваривание и усвоение питательных веществ кормов – углеводов, жиров, белков, аминокислот и минералов.
- В результате использования повышается рост и продуктивность, улучшается здоровье птицы, зоогигиенические условия содержания птицы, снижается содержание влаги в помете, выделение азота и фосфора с пометом, содержание аммиака в воздухе внутри животноводческих помещений.



Порядок применения

- Норма ввода составляет 250-500 г/тонну комбикорма.



Хранение

- Хранить в упаковке производителя в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте при температуре от 0 °С до 30 °С.
- Срок хранения – 12 месяцев со дня изготовления.



Упаковка

КЕМЗАЙМ® XPF сухой выпускают расфасованным по 1 и 5 кг в полимерные контейнеры, по 10, 15, 20 и 25 кг во влагонепроницаемые бумажные мешки с полимерным напылением или многослойные бумажные мешки с полиэтиленовым вкладышем, по 500, 1000 кг в биг-бэги.

Ферменты



КЕМЗАЙМ® MAP сухой KEMZYME® MAP dry



КЕМЗАЙМ® MAP сухой – кормовая добавка для повышения переваримость питательных веществ в рационах свиней и сельскохозяйственной птицы.



Характеристики

- Специальная комбинация ферментов, расщепляющих НПС; комплексы амилаз и протеаз для улучшения расщепления НПС, крахмала и аминокислот.
- Сочетание грибковых и бактериальных ферментов, обеспечивающих активность в более широком диапазоне pH.
- Синергическое действие нескольких ферментов.
- Улучшенная технология хранения обеспечивает необходимую активность и эффективность ферментов.



Действующие вещества

Ксиланаза, β-глюканаза, целлюлаза, протеаза, α-амилаза.



Биологические свойства

- КЕМЗАЙМ® MAP сухой содержит комплекс ферментов, которые расщепляют в кишечнике животных некрахмальные полисахариды (пентозаны, бета-глюканы, целлюлозу) и улучшают усвоение питательных веществ кормов.
- В результате использования добавки КЕМЗАЙМ® MAP сухой повышается рост и продуктивность, улучшается здоровье животных, снижается содержание влаги в помете, уменьшается содержание аммиака в воздухе внутри животноводческих помещений, улучшаются зоогигиенические условия содержания животных.



Порядок применения

- Норма ввода составляет 250-500 г/тону комбикорма.



Хранение

- Хранить в упаковке производителя в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте при температуре от 0 °C до 25 °C.
- Срок хранения – 12 месяцев со дня изготовления.



Упаковка

КЕМЗАЙМ® MAP сухой выпускают расфасованным по 1 и 5 кг в полимерные контейнеры, по 10, 15, 20 и 25 кг во влагонепроницаемые бумажные мешки с полимерным напылением или многослойные бумажные мешки с полиэтиленовым вкладышем, по 500, 900, 1000 кг в биг-бэги.

Ферменты



КЕМЗАЙМ® Плюс Р сухой KEMZYME® Plus P dry



КЕМЗАЙМ® Плюс Р сухой – кормовая добавка для повышения переваримости питательных веществ в рационах свиней и сельскохозяйственной птицы на основе пшеницы, ржи, тритикале, ячменя, овса, шротов и жмыхов.



Характеристики

- Мультиэнзимный комплекс с 6 заявленными и подтвержденными типами ферментативных активностей.
- Благодаря наличию в своем составе ферментов грибкового и бактериального происхождения обладает активностью в широком диапазоне значений pH.
- Содержит улучшенную природную термостабильную 6-фитазу (сухая форма), оптимизированную для максимального разрушения фитатного комплекса, в результате чего увеличивается высвобождение фосфора и кальция.



Действующие вещества

Ксиланаза, β-глюканаза, целлюлаза, протеаза, амилаза, фитаза.



Биологические свойства

- КЕМЗАЙМ® Плюс Р сухой содержит ферменты, которые расщепляют в кишечнике животных некрахмальные полисахариды (пентозаны, бета-глюканы, целлюлозу), а также высвобождают фосфор, связанный с фитиновой кислотой, тем самым улучшается переваривание и усвоение питательных веществ кормов – углеводов, жиров, аминокислот и минералов.
- В результате использования повышается рост и продуктивность, улучшается здоровье животных, зоогигиенические условия содержания животных, снижается содержание влаги в помете, выделение азота и фосфора с пометом, содержание аммиака в воздухе внутри животноводческих помещений.



Порядок применения

- Норма ввода составляет 500-1000 г/тонну комбикорма.



Хранение

- Хранить в упаковке производителя в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте при температуре от 0 °C до 30 °C.
- Срок хранения – 24 месяцев со дня изготовления.



Упаковка

КЕМЗАЙМ® Плюс Р сухой выпускают расфасованным по 1 и 5 кг в полимерные контейнеры, по 10, 15, 20 и 25 кг во влагонепроницаемые бумажные мешки с полимерным напылением или с полиэтиленовым вкладышем.

Ферменты



КЕМЗАЙМ® Плюс Р жидкий KEMZYME® Plus P liquid



КЕМЗАЙМ® Плюс Р жидкий – кормовая добавка для повышения переваримости питательных веществ в рационах свиней и сельскохозяйственной птицы на основе пшеницы, ржи, тритикале, ячменя, овса, шротов и жмыхов.



Характеристики

- Мультиэнзимный комплекс с 5 заявленными и подтвержденными типами ферментативных активностей.
- Благодаря наличию в своем составе ферментов грибкового и бактериального происхождения обладает активностью в широком диапазоне значений pH.
- Содержит улучшенную природную термостабильную 6-фитазу (сухая форма), оптимизированную для максимального разрушения фитатного комплекса, в результате чего увеличивается высвобождение фосфора и кальция.



Действующие вещества

β-глюканаза, целлюлаза, α-амилаза, ксиланаза, фитаза.



Биологические свойства

- КЕМЗАЙМ® Плюс Р жидкий содержит ферменты, которые расщепляют в кишечнике животных некрахмальные полисахариды (пентозаны, бета-глюканы, целлюлозу), а также высвобождают фосфор, связанный с фитиновой кислотой, тем самым улучшается переваривание и усвоение питательных веществ кормов – углеводов, жиров, аминокислот и минералов.
- В результате использования добавки КЕМЗАЙМА® Плюс Р жидкий повышается рост и продуктивность, улучшается здоровье животных, зоогигиенические условия содержания животных, снижается содержание влаги в помете, выделение азота и фосфора с пометом, содержание аммиака в воздухе внутри животноводческих помещений.



Порядок применения

- Норма ввода составляет 175 г/тону комбикорма.
- Норма ввода составляет 50 кг/тону воды (развести сразу перед поением).



Хранение

- Хранить в упаковке производителя в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте при температуре от 0 °C до 30 °C.
- Срок хранения – 6 месяцев со дня изготовления.



Упаковка

КЕМЗАЙМ® Плюс Р жидкий выпускают расфасованным по 1 и 5 л в полимерные бутылки, 10, 15, 20, 25 л в полимерные канистры, по 100, 200 л в полимерные бочки, по 500 и 1000 л в пластиковые емкости.

Ферменты



КЕМЗАЙМ® Плюс сухой KEMZYME® Plus dry



КЕМЗАЙМ® Плюс сухой – кормовая добавка для повышения переваримости питательных веществ в рационах свиней и сельскохозяйственной птицы на основе пшеницы, ржи, тритикале, ячменя, овса, шротов и жмыхов.

Характеристики

- Мультиэнзимный комплекс с 5 заявленными и подтвержденными типами ферментативных активностей.
- Ферменты, расщепляющие некрахмальные полисахариды, и обладающие широким спектром ферментативной активности.
- Активен в широком диапазоне значений pH благодаря наличию в своем составе ферментов грибкового и бактериального происхождения.
- Применяется в сухом виде перед гранулированием.
- Пригоден для использования при температуре гранулирования до 80 °C.

Действующие вещества

Ксиланаза, β-глюканаза, целлюлаза, протеаза и амилаза.



Биологические свойства

- Кемзайм® Плюс сухой содержит ферменты, которые расщепляют в кишечнике животных некрахмальные полисахариды (пентозаны, бета-глюканы, целлюлозу) и улучшают усвоение питательных веществ кормов.
- В результате использования КЕМЗАЙМ® Плюс сухого повышается рост и продуктивность, улучшается здоровье животных, снижается содержание влаги в помете, уменьшается содержание аммиака в воздухе внутри животноводческих помещений, улучшаются зоогигиенические условия содержания животных.



Порядок применения

- Норма ввода составляет 500-1000 г/тонну комбикорма, для бройлеров – 250-1000 г/тонну комбикорма.



Хранение

- Хранят в упаковке производителя в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте, при температуре от 0°C до 30°C.
- Срок хранения – 12 месяцев со дня изготовления.



Упаковка

КЕМЗАЙМ® Плюс сухой выпускают расфасованным по 1 и 5 кг в полимерные контейнеры; по 10, 15, 20 и 25 кг во влагонепроницаемые бумажные мешки с полимерным напылением или с полиэтиленовым вкладышем; по 500 и 1000 кг в биг-бэги.

Ферменты



КЕМЗАЙМ® W сухой KEMZYME® W dry



КЕМЗАЙМ® W сухой – кормовая добавка для повышения переваримости питательных веществ в рационах свиней и сельскохозяйственной птицы на основе пшеницы, ржи, тритикале, ячменя, овса, шротов и жмыхов.



Характеристики

- Мультиэнзимный комплекс с подтвержденными типами ферментативных активностей.
- Энзимы, расщепляющие некрахмальные полисахариды, обладают широким спектром ферментативной активности.



Действующие вещества

Ксиланаза, β-глюканаза, целлюлаза, протеаза, амилаза.



Биологические свойства

- КЕМЗАЙМ® W сухой содержит ферменты, которые расщепляют в кишечнике животных некрахмальные полисахариды (пентозаны, бета-глюканы, целлюлозу) и улучшают усвоение питательных веществ кормов.
- В результате использования добавки КЕМЗАЙМ® W сухой повышается рост и продуктивность, улучшается здоровье животных, снижается содержание влаги в помете и содержание аммиака в воздухе внутри животноводческих помещений, тем самым улучшаются зоогигиенические условия содержания животных.



Порядок применения

- Норма ввода составляет 500-1000 г/тонну корма.



Хранение

- Хранить в упаковке производителя в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте при температуре от 0 °C до 30 °C.
- Срок хранения – 12 месяцев со дня изготовления.



Упаковка

КЕМЗАЙМ® W сухой выпускают расфасованным 25 кг во влагонепроницаемые бумажные мешки с полимерным напылением.

Ферменты



KEMЗАЙМ® W жидкий KEMZYME® W liquid



KEMЗАЙМ® W жидкий – кормовая добавка для повышения переваримости питательных веществ в рационах свиней и сельскохозяйственной птицы с высоким содержанием пшеницы, ржи, тритикале, ячменя, овса, шротов и жмыхов.



Характеристики

- Мультиэнзимный комплекс с подтвержденными типами ферментативных активностей.
- Энзимы, расщепляющие некрахмальные полисахариды, обладают широким спектром ферментативной активности.



Действующие вещества

Ксиланаза, β-глюканаза, целлюлаза, α-амилаза.



Биологические свойства

- KEMЗАЙМ® W жидкий содержит ферменты, которые расщепляют в кишечнике животных некрахмальные полисахариды (пентозаны, бета-глюканы, целлюлозу) и улучшают усвоение питательных веществ кормов – углеводов, жиров, аминокислот и минералов.
- В результате использования добавки KEMЗАЙМ® W жидкий повышается рост и продуктивность, улучшается здоровье животных, снижается содержание влаги в помете и содержание аммиака в воздухе внутри животноводческих помещений, тем самым улучшаются зооигиенические условия содержания животных.



Порядок применения

- Норма ввода составляет 50-100 г/тону комбикорма.



Хранение

- Хранить в упаковке производителя в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте при температуре от 0 °С до 30 °С.
- Срок хранения – 6 месяцев со дня изготовления.



Упаковка

KEMЗАЙМ® W жидкий выпускают расфасованным по 1, 5, 10, 15, 20, 25, 100, 200, 500 и 1000 кг в пластиковые контейнеры.

Ферменты



КЕМЗАЙМ® W концентрированный сухой KEMZYME® W concentrated dry



КЕМЗАЙМ® W концентрированный сухой – кормовая добавка для повышения переваримости питательных веществ в рационах свиней и сельскохозяйственной птицы.



Характеристики

- Мультиэнзимный комплекс с подтвержденными типами ферментативных активностей.
- Энзимы, расщепляющие некрахмальные полисахариды, обладают широким спектром ферментативной активности.
- Активен в широком диапазоне значений pH благодаря наличию в своем составе ферментов грибкового и бактериального происхождения.



Действующие вещества

Ксиланаза, β-глюканаза, целлюлаза, протеаза, амилаза.



Биологические свойства

- КЕМЗАЙМ® W концентрированный сухой содержит ферменты, которые расщепляют в кишечнике животных некрахмальные полисахариды (пентозаны, бета-глюканы, целлюлозу) и улучшают усвоение питательных веществ кормов.
- В результате использования добавки КЕМЗАЙМ® W концентрированный сухой повышается рост и продуктивность, улучшается здоровье животных, снижается содержание влаги в помете и содержание аммиака в воздухе внутри животноводческих помещений, тем самым улучшаются зоогигиенические условия содержания животных.



Порядок применения

- Норма ввода составляет 50-100 г/тону комбикорма.



Хранение

- Хранить в упаковке производителя в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте при температуре от 0 °C до 25 °C.
- Срок хранения – 12 месяцев со дня изготовления.



Упаковка

КЕМЗАЙМ® W концентрированный сухой выпускают расфасованным по 25 кг во влагонепроницаемые бумажные мешки с полимерным напылением.

Ферменты



КЕМЗАЙМ® X PRO сухой KEMZYME® X PRO dry



КЕМЗАЙМ® X PRO сухой – кормовая добавка для повышения переваримости питательных веществ в рационах свиней и сельскохозяйственной птицы, содержащих большие количества клетчатки.

Характеристики

- Мультиэнзимный комплекс с 4 декларированными, контролируемыми аналитическими методами ферментативными активностями.
- Специальная комбинация ферментов, расщепляющих некрахмальные полисахариды (НПС).
- Сочетание грибковых и бактериальных ферментов, обеспечивающих активность в более широком диапазоне pH.
- Улучшенная технология хранения обеспечивает необходимую активность и эффективность ферментов.

Действующие вещества

Ксиланаза, β -глюканаза, целлюлаза, альфа-амилаза.



Биологические свойства

- КЕМЗАЙМ® X PRO сухой содержит ферменты, которые расщепляют в кишечнике свиней и сельскохозяйственной птицы некрахмальные полисахариды (пентозаны, бета-глюканы, целлюлозу), тем самым улучшается переваривание и усвоение питательных веществ кормов — углеводов, жиров, белков, аминокислот и минералов.
- В результате использования повышается рост и продуктивность, улучшается здоровье, зоогигиенические условия содержания, снижается содержание влаги в помете, уменьшается содержание аммиака в воздухе внутри животноводческих помещений.



Порядок применения

- Вносят в комбикорм или кормовое сырье на комбикормовых заводах или в кормоцехах хозяйств, используя существующие технологии смешивания.
- Норма ввода составляет 250-500 г/тону комбикорма.
- Сохраняет свою активность после грануляции при максимальной температуре 85 °C.



Хранение

- Хранят в упаковке производителя в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте, при температуре от 0 °C до 30 °C.
- Срок хранения — 12 месяцев со дня изготовления.



Упаковка

Выпускают расфасованным по 1 и 5 кг в полимерные контейнеры, по 10, 15, 20 и 25 кг во влагонепроницаемые бумажные мешки с полимерным напылением или многослойные бумажные мешки с полиэтиленовым вкладышем, по 500, 1000 кг в биг-бэги.

Ферменты

КЕМЗАЙМ® Протеаза **KEMZYME® Protease dry**



КЕМЗАЙМ® Протеаза – кормовая добавка для повышения переваримости питательных веществ в рационах поросят-отъемышей, поросят на дорастивании, свиней на откорме, кур-несушек, цыплят-бройлеров и индеек.



Характеристики

- Моноферментная кормовая добавка на основе 3-х видов протеаз (кислая, нейтральная, щелочная).
- Эффективно расщепляет протеин корма до простых пептидов и аминокислот.
- Улучшает переваримость высокобелковых сырьевых компонентов корма.
- Включается в состав корма в сухом виде перед гранулированием.
- Термостабильна – сохраняет эффективность после грануляции.



Действующие вещества

Фермент протеаза с активностью не менее 17000 ед/г (продуценты *Aspergillus niger* CICC2238, *Bacillus licheniformis* ACCC10236, *Aspergillus niger* CICC2103).



Биологические свойства

- КЕМЗАЙМ® Протеаза состоит из трех видов протеаз (кислая, нейтральная и щелочная).
- Каждый конкретный вид протеаз высвобождается в разных участках желудочно-кишечного тракта, в зависимости от pH среды.
- Протеаза является ферментом, гидролизующим протеин кормов до пептидов и аминокислот, которые в дальнейшем легко используются организмом.
- В результате применения добавки улучшается использование протеина кормов, повышается рост и продуктивность животных и птиц.



Порядок применения

- для поросят-отъемышей, поросят на дорастивании, свиней на откорме – 200-300 г/тону комбикорма.
- для кур-несушек, цыплят-бройлеров и индеек на откорме 150-300 г/тону комбикорма.



Хранение

- Хранят в упаковке производителя в защищенном от прямых солнечных лучей месте, при температуре от 0°C до 30°C и относительной влажности не более 75%.
- Срок хранения – 24 месяца со дня изготовления.
- КЕМЗАЙМ® Протеаза сохраняет эффективность при грануляции с технологическими параметрами: максимальная температура 85°C в течение 3-х минут.



Упаковка

Выпускают расфасованной по 1 и 5 кг в полимерные контейнеры, по 10, 15, 20 и 25 кг во влагонепроницаемые бумажные мешки с полимерным напылением или многослойные бумажные мешки с полиэтиленовым вкладышем, по 500, 900, 1000 кг в биг-бэги.

Ферменты



Ксайджест HT 2D сухой Xysgest HT 2D dry



Ксайджест HT 2D сухой – кормовая добавка для повышения переваримости питательных веществ в рационах кур-несушек и цыплят-бройлеров, поросят и свиноматок.



Характеристики

- Моноферментная кормовая добавка на основе Ксиланазы.
- Эффективно расщепляет арабиноксиланы – некрахмалистые полисахариды, содержащиеся в пшенице и других растительных кормах.
- Позволяет увеличить питательную ценность рациона и снизить конверсию корма.
- Включается в состав корма в сухом виде перед гранулированием.
- Отличается высокой термостабильностью – сохраняет эффективность после грануляции при максимальной температуре 85°C в течение 3-х минут.
- Низкая норма ввода (30 г/т готового корма) позволяет использовать кормовую добавку в составе витаминно-минеральных премиксов.



Действующие вещества

Ксиланаза (штамм продуцент *Thermopolyspora flexuosa* ATCC 35864) с активностью не менее 1500000 ед/г.



Биологические свойства

- Ксайджест HT 2D сухой состоит из эндо-1,4-бета-ксиланазы, которая гидролизует арабиноксиланы. Ксиланаза является ферментом, участвует в разрушении клеточных стенок растений посредством ферментативного гидролиза гликозидных связей некрахмальных полисахаридов – в первую очередь ксиланов (пентозанов), а также целлюлозы и β- глюканов.
- В результате применения добавки улучшается пищеварение, повышается рост и продуктивность животных и птиц.



Порядок применения

- Вносят в комбикорм на комбикормовых заводах или в кормоцехах хозяйств, используя существующие технологии смешивания.
- Норма ввода составляет 30 г/тонну комбикорма.



Хранение

- Хранят в упаковке производителя в защищенном от прямых солнечных лучей месте, при температуре от 0°C до 30°C и относительной влажности не более 75%.
- Срок хранения – 24 месяца со дня изготовления.



Упаковка

Ксайджест HT 2D сухой выпускают расфасованным по 1 и 5 кг в полимерные контейнеры, по 10, 15, 20 и 25 кг во влагонепроницаемые бумажные мешки с полимерным напылением или многослойные бумажные мешки с полиэтиленовым вкладышем, по 500, 900, 1000 кг в биг-бэги.

Ферменты



Ксайджест НТ 20D сухой Xygest HT 20D dry



Ксайджест НТ 20D сухой – кормовая добавка для повышения переваримости питательных веществ в рационах кур-несушек и цыплят-бройлеров, поросят и свиноматок.



Характеристики

- Моноферментная кормовая добавка на основе ксиланазы.
- Эффективно расщепляет арабиноксиланы – некрахмалистые полисахариды, содержащиеся в пшенице и других растительных компонентах корма.
- Позволяет увеличить питательную ценность рациона.
- Способствует снижению конверсии корма.
- Термостабилен – сохраняет эффективность после грануляции.



Действующие вещества

Фермент ксиланаза (штамм продуцент *Thermopolyspora flexuosa* ATCC 35864) с активностью не менее 150 000 ед/г.



Биологические свойства

- Ксайджест НТ 20D сухой состоит из эндо-1,4-бета-ксиланазы, которая гидролизует арабиноксиланы.
- Ксиланаза является ферментом, участвует в разрушении клеточных стенок растений посредством ферментативного гидролиза гликозидных связей некрахмальных полисахаридов – в первую очередь ксиланов (пентозанов), а также целлюлозы и β-глюканов.
- В результате применения добавки улучшается переваримость растительных компонентов корма, повышается продуктивность животных и птиц.



Порядок применения

- Норма ввода составляет 300 г/тону комбикорма.



Хранение

- Хранят в упаковке производителя в защищенном от прямых солнечных лучей месте, при температуре от 0°C до 30°C и относительной влажности не более 75%.
- Срок хранения – 24 месяца со дня изготовления.
- Ксайджест НТ 20D сухой сохраняет эффективность после грануляции при максимальной температуре 85°C в течение 3-х минут.



Упаковка

Выпускают расфасованной по 1 и 5 кг в полимерные контейнеры, по 10, 15, 20 и 25 кг во влагонепроницаемые бумажные мешки с полимерным напылением или многослойные бумажные мешки с полиэтиленовым вкладышем, по 500, 900, 1000 кг в биг-бэги.

Ферменты



НУТРИКЕМ сухой NUTRIKEM dry



НУТРИКЕМ сухой – кормовая добавка для повышения переваримости питательных веществ в рационах свиней и сельскохозяйственной птицы на основе пшеницы, ячменя, шротов и жмыхов.



Характеристики

- Эффективно расщепляет полисахариды, относящиеся к категории некрахмальных.
- Позволяет эффективно увеличивать питательную ценность кормов и улучшать их конверсию.
- Уменьшает количество выделяемого с пометом аммиака.



Действующие вещества

β-глюканаза, целлюлаза, амилаза, протеаза, ксиланаза, лецитин.



Биологические свойства

- НУТРИКЕМ сухой содержит ферменты, которые расщепляют в кишечнике животных некрахмальные полисахариды (пентозаны, бета-глюканы, целлюлозу) и дополнены эмульгатором, который улучшает эмульгирование жиров.
- В результате использования добавки НУТРИКЕМ сухой увеличивается усвоение питательных веществ корма, повышается рост и продуктивность, улучшается здоровье животных, снижается содержание влаги в помете, уменьшается содержание аммиака в воздухе внутри животноводческих помещений, улучшаются зоогигиенические условия содержания животных.



Порядок применения

- Норма ввода составляет 500-1000 г/тонну комбикорма.



Хранение

- Хранить в упаковке производителя в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте при температуре от 0 °С до 30 °С.
- Срок хранения – 12 месяцев со дня изготовления.



Упаковка

НУТРИКЕМ сухой выпускают расфасованным по 1 и 5 кг в полимерные контейнеры, по 10, 15, 20 и 25 кг во влагонепроницаемые бумажные мешки с полимерным напылением или с полиэтиленовым вкладышем, по 500, 1000 кг в биг-бэги.



Биосурфактант (эмульгатор)

ЛИСОФОРТ® Бустер сухой LYSOFORTE® Booster dry



ЛИСОФОРТ® Бустер сухой – кормовая добавка для повышения переваримости и усвояемости питательных веществ в рационах свиней, сельскохозяйственной птицы и аквакультуры.



Характеристики

- Эмульгирование жиров корма в кишечнике.
- Образование меньших по размеру мицелл.
- Увеличение эффективности липазы.
- Повышение проницаемости клеточных стенок слизистой оболочки кишечника.
- Увеличение доступности питательных веществ корма.



Действующие вещества

Лецитин.



Биологические свойства

- ЛИСОФОРТ® Бустер сухой улучшает усвоение питательных веществ корма у свиней, сельскохозяйственной птицы и аквакультуры. Ускоряет образование водно-жировой эмульсии в кишечнике, способствует гидролизу жиров и формированию мицелл в кишечнике, улучшает всасывание жиров и других питательных веществ корма.
- В результате использования добавки ЛИСОФОР® Бустер сухой увеличивается интенсивность роста молодняка и продуктивность взрослого поголовья, улучшается эффективность использования корма.



Порядок применения

- Норма ввода для свиней и сельскохозяйственной птицы составляет 250-500 г/т корма;
- Норма ввода для аквакультуры составляет 1-2 кг/т корма.



Хранение

- Хранить в упаковке производителя в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте при температуре от 0 °С до 25 °С.
- Срок хранения – 24 месяца со дня изготовления.



Упаковка

ЛИСОФОРТ® Бустер сухой выпускают расфасованным по 1 и 5 кг в полимерные контейнеры, по 10, 15, 20 и 25 кг во влагонепроницаемые бумажные мешки с полимерным напылением или с полиэтиленовым вкладышем, по 500, 1000 кг в биг-бэги.



Биосурфактант (эмульгатор)

ЛИСОФОРТ® ЭКСТЕНД сухой LYSOFORTE® EXTEND dry



ЛИСОФОРТ® ЭКСТЕНД сухой – кормовая добавка для повышения переваримости и усвояемости питательных веществ в рационах сельскохозяйственных животных, в том числе птиц, и аквакультуры.



Характеристики

- Эмульгирование жиров корма в кишечнике.
- Образование более стабильной мелкодисперсной эмульсии.
- Ускоренный гидролиз.
- Увеличение доступности питательных веществ корма.



Действующие вещества

Лецитин.



Биологические свойства

- ЛИСОФОРТ® ЭКСТЕНД сухой улучшает усвоение питательных веществ корма сельскохозяйственных животных, в том числе птиц, и аквакультуры. Ускоряет образование водно-жировой эмульсии в кишечнике, способствует гидролизу жиров, всасыванию их и других питательных веществ корма.
- В результате использования добавки ЛИСОФОРТ® ЭКСТЕНД сухой увеличивается интенсивность роста молодняка и продуктивность взрослого поголовья, улучшается эффективность использования корма.



Порядок применения

- Норма ввода для свиней и сельскохозяйственной птицы – 250-500 г/т корма.
- Норма ввода для телят – 2 кг/т ЗЦМ.
- Норма ввода для аквакультуры – 1-2 кг/тонну корма.



Хранение

- Хранить в упаковке производителя в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте при температуре от 0 °С до 25 °С.
- Срок хранения – 24 месяца со дня изготовления.



Упаковка

ЛИСОФОРТ® ЭКСТЕНД сухой выпускают расфасованным по 1 и 5 кг в полимерные контейнеры, по 10, 15, 20 и 25 кг во влагонепроницаемые бумажные мешки с полимерным напылением или с полиэтиленовым вкладышем, по 500, 1000 кг в биг-бэги.

Ароматические добавки



Масло Ванильный Аромат сухой Butter Vanilla Arome dry



Масло Ванильный Аромат сухой – кормовая добавка для улучшения вкуса и запаха кормов для сельскохозяйственных животных, в том числе птиц.



Характеристики

- Является термостабильным продуктом и может использоваться в гранулированных кормах.



Действующие вещества

Гамма-ноналактон, этилбутират, ванилин, этилванилин, бутилгидроксанизол, пропан-1,2 – диол, поваренная соль, двуокись кремния.



Биологические свойства

- Масло Ванильный Аромат сухой придает кормам для сельскохозяйственных животных стойкий привлекательный запах и вкус. Благодаря этому увеличивается потребление кормов, улучшается интенсивность роста и повышается продуктивность животных.
- Позволяет включать в рацион большее количество менее ценных и более дешевых ингредиентов.
- Масло Ванильный Аромат сухой не теряет свойств после грануляции корма.



Порядок применения

- Норма ввода составляет 200-500 г/тону корма.



Хранение

- Хранить в упаковке производителя в защищенном от прямых солнечных лучей месте, при температуре от 0 °С до 30 °С.
- Срок хранения – 24 месяца со дня изготовления.



Упаковка

Добавку Масло Ванильный Аромат сухой выпускают расфасованной по 25 кг во влагонепроницаемые бумажные мешки с полимерным напылением.

Анионовые соли

НутриКАБ
NutriCAB

НутриКАБ – добавка кормовая для оптимизации баланса катионов и анионов в организме коров и свиноматок.

**Характеристики**

- Технология micropearls (микрокапсулы) путем распылительного замораживания позволяет получать микрокапсулы с концентрацией кальция хлорида 80%.
- Легкость в применении, как в хозяйствах, так и на комбикормовых и премиксных заводах.
- Конкурентные преимущества капсул против чистых кислых солей:
 - не снижает поедаемость;
 - не гигроскопичен;
 - не вызывает коррозии.

**Действующие вещества**

Кальция хлорид.

**Биологические свойства**

- В состав добавки НутриКАБ входит хлорид кальция, который за счет подкисляющего эффекта анионов хлора оптимизирует кислотно-щелочной баланс в организме животного перед родами.
- В результате усиливается активность гормонов, отвечающих за мобилизацию кальция из костной ткани и увеличение всасывания из желудочно-кишечного тракта.
- Стабилизация концентрации кальция в крови значительно снижает вероятность таких послеродовых осложнений, вызванных гипокальциемией, как парез и задержка плаценты.

**Порядок применения**

- Норма ввода для коров составляет 100-250 г/голову/день в течение 3-4 недель до отела.
- Норма ввода для свиноматок 20-30 г/голову/день (4-7 кг/т корма) в течение 3-4 недель до опороса.

**Хранение**

- Хранить в упаковке производителя в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте при температуре от 0 °С до 30 °С.
- Срок хранения – 18 месяцев со дня изготовления.

**Упаковка**

НутриКАБ выпускают расфасованным по 25 кг во влагонепроницаемых бумажных мешках с полимерным напылением.

Поддержка здоровья ЖКТ



БутиПЕРЛ®
ButiPEARL®



БутиПЕРЛ® – кормовая добавка для стимуляции роста кишечных ворсинок и регенерации эпителия слизистой оболочки кишечника у поросят и сельскохозяйственной птицы.

**Характеристики**

- Высокое содержание бутирата кальция (до 55%), микрокапсулированного по специальной технологии распылительного замораживания MicroPEARLS (микрокапсулы).
- Кальциевая соль специально выбрана для лучшего взаимодействия капсулы и ее содержимого во время технологического процесса микрокапсулирования.
- Постепенное высвобождение активного вещества на всем протяжении желудочно-кишечного тракта.

**Действующие вещества**

Бутират кальция, гидрогенизированный пальмовый жир, ванилин.

**Биологические свойства**

- Бутират кальция защищает целостность слизистой оболочки кишечника, стимулирует рост ворсинок, помогает быстро восстанавливать стенку кишечника при повреждении, предотвращает проникновение патогенных микроорганизмов через стенку кишечника.
- В результате использования добавки БутиПЕРЛ® улучшается рост животных, конверсия корма и сохранность поголовья.
- Специальная технология инкапсулирования активных ингредиентов добавки БутиПЕРЛ® позволяет бутирату кальция без потерь проходить верхние отделы желудочно-кишечного тракта и активно действовать непосредственно в кишечнике.

**Порядок применения**

- Норма ввода для поросят с момента отъема до десятидневного возраста 1000-1500 г/т корма;
- Норма ввода для бройлеров и кур-несушек составляет 200-300 г/т корма.

**Хранение**

- Хранить в упаковке производителя в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте при температуре от 0 °C до 30 °C.
- Срок хранения – 24 месяца со дня изготовления.

**Упаковка**

БутиПЕРЛ® выпускают расфасованным по 25 кг во влагонепроницаемые бумажные мешки с полимерным напылением.

Подкислители



АСИД ЛАК® ХТ сухой – добавка кормовая для подкисления кормов, оптимизации процессов пищеварения и повышения продуктивности сельскохозяйственных животных, в том числе птиц.

Характеристики

- Снижает кислотность содержимого желудка.
- Способствует росту молочнокислых бактерий.
- Подавляет развитие патогенной кишечной микрофлоры.
- Стимулирует секрецию собственных ферментов в желудке.
- Улучшает перевариваемость питательных веществ.
- Предотвращает диарею.

Действующие вещества

Молочная кислота, муравьиная кислота, фумаровая кислота, лимонная кислота.



Биологические свойства

- АСИД ЛАК® ХТ сухой снижает уровень pH в кормах и в желудочно-кишечном тракте животных, активирует работу пищеварительных ферментов, ингибирует развитие патогенных бактерий, таких как сальмонеллы, кишечные палочки и клостридии, стимулирует рост и размножение полезной молочнокислой микрофлоры.
- Применение добавки с кормом способствует улучшению вкусовых качеств и санитарно-гигиенических показателей корма, улучшает его усвояемость, повышает продуктивность сельскохозяйственных животных, в том числе птиц, снижает смертность и затраты кормов.



Порядок применения

- Норма ввода составляет 2,0-5,0 кг/т корма.



Хранение

- Хранить в упаковке производителя в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте при температуре от 0 °C до 30 °C.
- Срок хранения – 24 месяца со дня изготовления.



Упаковка

АСИД ЛАК® ХТ сухой выпускают расфасованным по 1 и 5 кг в полимерные контейнеры, по 10, 15, 20 и 25 кг во влагонепроницаемые бумажные мешки с полимерным напылением или с полиэтиленовым вкладышем, по 500, 1000 кг в биг-бэги.

Подкислители



АСИД ЛАК® сухой – кормовая добавка для подкисления кормов, оптимизации процессов пищеварения и повышения продуктивности сельскохозяйственных животных, в том числе птиц.

Характеристики

- Снижает кислотность содержимого желудка.
- Способствует росту молочнокислых бактерий.
- Подавляет развитие патогенной кишечной микрофлоры.
- Стимулирует секрецию собственных ферментов в желудке.
- Улучшает перевариваемость питательных веществ.
- Предотвращает диарею.

Действующие вещества

Фумаровая кислота, молочная кислота, муравьиная кислота, пропионовая кислота, лимонная кислота.



Биологические свойства

- АСИД ЛАК® снижает уровень pH в кормах и желудочно-кишечном тракте животных, активирует работу пищеварительных ферментов, ингибирует развитие патогенных бактерий, таких как сальмонеллы, кишечные палочки и клостридии, стимулирует рост и размножение полезной молочнокислой микрофлоры.
- Применение добавки с кормом способствует улучшению вкусовых качеств и санитарно-гигиенических показателей корма, улучшает его усвояемость, повышает продуктивность сельскохозяйственных животных, в том числе птиц, снижает смертность и затраты кормов.



Порядок применения

- Норма ввода составляет 2,0-5,0 кг/т корма в зависимости от загрязненности корма патогенными бактериями, от условий и времени хранения.



Хранение

- Хранить в упаковке производителя в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте при температуре от 0 °C до 30 °C.
- Срок хранения – 24 месяца со дня изготовления.



Упаковка

АСИД ЛАК® сухой выпускают расфасованным по 25 кг во влагонепроницаемые бумажные мешки с полимерным напылением, по 1 и 5 кг в полимерные контейнеры, по 10, 15, 20 и 25 кг во влагонепроницаемые бумажные мешки с полимерным напылением, полиэтиленовым вкладышем или по 500, 1000 кг в биг-бэги.

Пробиотическая добавка



КЛОСТАТ® сухой – кормовая добавка для нормализации микрофлоры кишечника у свиней, сельскохозяйственной птицы и крупного рогатого скота.

**Характеристики**

- Стабилен в кормах и премиксах.
- Термостабилен при гранулировании.
- Совместим со всеми органическими кислотами.
- Совместим со всеми кокцидиостатиками.

**Действующие вещества**

Микробная масса спорообразующих бактерий *Bacillus subtilis* PB6.

**Биологические свойства**

- Бактерии *Bacillus subtilis* PB6 выделены из кишечника здоровых цыплят и обладают высокой устойчивостью к сокам и ферментам желудочно-кишечного тракта животных, антагонистической активностью к патогенным и условно-патогенным микроорганизмам.
- КЛОСТАТ® сухой нормализует микрофлору кишечника, улучшает процесс пищеварения, повышает неспецифическую резистентность организма сельскохозяйственных животных и птицы, способствует повышению сохранности и продуктивности поголовья, снижает затраты корма на единицу продукции.

**Порядок применения**

- поросатам-отъемышам, свиньям и птице – 500 г/тону комбикорма;
- коровам в период позднего сухостоя и в период лактации – 20-40 г/голову/сутки;
- телятам с первого дня жизни – 10-20 г/голову/сутки.

**Хранение**

- Хранить в упаковке производителя в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте при температуре от 0 °С до 25 °С.
- Срок хранения – 24 месяца со дня изготовления.

**Упаковка**

КЛОСТАТ® сухой выпускают расфасованным во влагонепроницаемые бумажные мешки с полимерным напылением или бумажным вкладышем по 10, 15, 20, 25 кг, а также в герметично укупоренные пластиковые контейнеры по 5 или 1 кг, биг-бэги по 500, 1000 кг.

Пробиотическая добавка



КЛОСТАТ® HC SP сухой – кормовая добавка для нормализации микрофлоры кишечника у свиней, крупного рогатого скота и сельскохозяйственной птицы.

**Характеристики**

- Стабилен в кормах и премиксах.
- Термостабилен при гранулировании.
- Совместим со всеми органическими кислотами.
- Совместим со всеми кокцидиостатиками.

**Действующие вещества**

Микробная масса спорообразующих бактерий *Bacillus subtilis* PB6.

**Биологические свойства**

- Бактерии *B. Subtilis* PB6 выделены из кишечника здоровых цыплят и обладают высокой устойчивостью к сокам и ферментам желудочно-кишечного тракта животных, антагонистической активностью к патогенным и условно-патогенным микроорганизмам.
- КЛОСТАТ® HC SP сухой нормализует микрофлору кишечника, улучшает процесс пищеварения, повышает неспецифическую резистентность организма сельскохозяйственных животных и птицы, способствует повышению сохранности и продуктивности поголовья, снижает затраты корма на единицу продукции.

**Порядок применения**

- Норма ввода для поросят, свиней и птицы составляет 50 г/т комбикорма или 25-100 г на 1000 литров питьевой воды.
- Норма ввода для крупного рогатого скота – 100-200 г/т комбикорма или задается индивидуально из расчета 1-2 г на голову в день.
- Норма ввода для телят – 50 г/тонну ЗЦМ в течение всего периода выпойки.


**Хранение**

- Хранить в упаковке производителя в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте при температуре от 0 °С до 25 °С.
- Срок хранения – 24 месяца со дня изготовления.

**Упаковка**

Выпускают расфасованным по 10 г, 50 г, 100 г, 200 г в полимерных пакетах, во влагонепроницаемые бумажные мешки с полимерным напылением или с полиэтиленовым вкладышем по 10, 15, 20, 25 кг, а также в герметично укупоренные пластиковые контейнеры по 100 г и 1,5 кг, в биг-бэги по 500, 1000 кг.

Пробиотическая добавка

ЭНТЕРОШУР
ENTEROSUREKEMIN
Competition by Quality

ЭНТЕРОШУР (ENTEROSURE) – кормовая добавка для оптимизации процессов пищеварения, повышения продуктивности и сохранности свиней, крупного рогатого скота и сельскохозяйственной птицы.

**Характеристики**

- Снижает потребность в использовании антибиотических стимуляторов роста (кормовых антибиотиков)
- Снижает необходимость использования терапевтических антибиотиков
- Эффективен при дисбиозе, снижает риск появления влажного помета, диареи
- Повышает выживаемость поголовья
- Подавляет патогенные штаммы клостридий
- Снижает развитие кишечной палочки и других энтеробактерий, таких как сальмонелла
- Стимулирует рост лактобактерий и бифидобактерий
- Поддерживает разнообразный кишечный микробиом.

**Действующие вещества**

Микробная масса спорообразующих бактерий *Bacillus velezensis* (subtilis) (PB6), *Bacillus velezensis* (amyloliquefacies), *Bacillus licheniformis* (G3).

**Биологические свойства**

- Входящие в состав кормовой добавки живые спорообразующие бактерии рода *Bacillus* выделены из кишечника переболевших энтеритом цыплят и обладают высокой устойчивостью к сокам и ферментам желудочно-кишечного тракта животных, антагонистической активностью к грамположительным (клостридия) и грамотрицательным (сальмонелла и кишечная палочка) патогенным и условно-патогенным микроорганизмам.
- Кормовая добавка ЭНТЕРОШУР нормализует микрофлору кишечника, улучшает процесс пищеварения, повышает неспецифическую резистентность организма сельскохозяйственных животных и птицы, способствует повышению сохранности и продуктивности поголовья, снижает затраты корма на единицу продукции.

**Порядок применения**

- куры-несушки: 500 г/т корма;
- поросята-отъемыши: 500 г/т корма;
- бройлеры: 500 г/т корма;
- телята с первого дня жизни: 10-20 г/гол/сутки;
- индейки: 500 г/т корма;
- коровы в период позднего сухостоя и в период лактации: 20-40 г/гол/сутки
- свиньи на откорме: 500 г/т корма;
- свиноматки: 500 г/т корма;

**Хранение**

- Хранить в защищенном от прямых солнечных лучей месте при температуре от 0°C до 25°C и относительной влажности не более 75%.
- Срок хранения - 24 месяца с даты производства.

**Упаковка**

Выпускают расфасованным по 10 г, 50 г, 100 г, 200 г в полимерных пакетах; по 10 кг, 15 кг, 20 кг, 25 кг во влагонепроницаемых бумажных мешках с полимерным напылением или с полиэтиленовым вкладышем; по 10 г, 50 г, 100 г, 200 г, 1 кг, 5 кг в герметично укупоренных полимерных контейнерах; по 500 кг, 1000 кг в биг-бэгах.

Поддержка иммунитета

АЛИТА
ALETA

АЛИТА – кормовая добавка для повышения иммунитета и увеличения продуктивности сельскохозяйственных животных и птиц, а также аквакультуры.

**Характеристики**

- Содержание бета-(1,3)-глюканов – не менее 50,0%.
- Оптимизирует состояние организма при вакцинации и неблагоприятных периодах (стресс, смена кормов и т.д.).
- Поддерживает здоровье животных в рамках программ по уменьшению использования антибиотиков и программ замещения антибиотических стимуляторов роста.
- Способствует укреплению иммунной системы у молодняка.

**Действующие вещества**

Высушенные водоросли (*Euglena gracilis*).

**Хранение**

- Хранение в упаковке производителя, в защищенном от солнечных лучей месте при температуре от 0°C до 30°C.
- Срок хранения - 24 месяца со дня изготовления.

**Биологические свойства**

- АЛИТА является источником специфичных бета-(1,3)-глюканов с высокой биологической эффективностью и доступностью, которые поддерживают иммунную систему, особенно в стрессовых ситуациях.
- Эти специфичные полисахариды, попадая в желудочно-кишечный тракт, активируют макрофаги и дендритные клетки на выработку «сигнальных» веществ, мобилизующих другие иммунные клетки, отвечающие за неспецифический иммунитет.
- Отмечено положительное действие бета-глюканов на состояние полезной микрофлоры, что способствует улучшению общего состояния животных.
- Кормовая добавка оптимизирует состояние желудочно-кишечного тракта и состояние организма в целом, особенно в неблагоприятные периоды, такие как стресс, отъем, инфекции, смена кормов, антибиотикозамещение и вакцинация.

**Порядок применения**

- для аквакультуры: 100-500 г/тонну корма.
- для бройлеров 50-100 г/тонну корма.
- для крупного рогатого скота 100 г/кг корма.
- для поросят, свиней 100-200 г/тонну корма.
- для креветок 500 г/тонну корма.

**Упаковка**

Добавку выпускают расфасованной по 0,1; 1 и 5 кг в полимерные контейнеры, по 10; 15; 20 и 25 кг во влагонепроницаемые бумажные мешки с полимерным напылением или многослойные бумажные мешки с полиэтиленовым вкладышем средней плотности, по 200; 500 и 1000 кг в биг-бэги.

Поддержка иммунитета



АЛИТА D
ALETA D

АЛИТА D (ALETA D) – кормовая добавка для повышения иммунитета и увеличения продуктивности сельскохозяйственных животных и птиц, а также аквакультуры.

Характеристики

- Содержание бета - (1,3) - глюкана – не менее 5%.
- Оптимизирует состояние организма при вакцинации и неблагоприятных периодах (стресс, смена кормов и т.д.).
- Поддерживает здоровье животных в рамках программ по уменьшению использования антибиотиков и программ замещения антибиотических стимуляторов роста.
- Способствует укреплению иммунной системы у молодняка.

Действующие вещества

Высушенные водоросли (*Euglena gracilis*).



Биологические свойства

- АЛИТА D является источником специфических бета-(1,3)-глюканов с высокой биологической эффективностью и доступностью, которые поддерживают иммунную систему, особенно в стрессовых ситуациях.
- Эти специфические полисахариды, попадая в желудочно-кишечный тракт, активируют макрофаги и дендритные клетки на выработку «сигнальных» веществ, мобилизующих другие иммунные клетки, отвечающие за неспецифический иммунитет.
- Отмечено положительное действие бета-глюканов на состояние полезной микрофлоры, что способствует улучшению общего состояния животных.
- Кормовая добавка оптимизирует состояние желудочно-кишечного тракта и состояние организма в целом, особенно в неблагоприятные периоды, такие как стресс, отъем, инфекции, смена кормов, антибиотикозамещение и вакцинация.



Порядок применения

- Норма ввода для сельскохозяйственных животных и птиц: 1-2 кг/тонну комбикорма;
- Для аквакультуры: 1-5 кг/тонну корма.



Хранение

- Хранение в упаковке производителя в сухом, защищенном от солнечных лучей месте при температуре от 0°C до 30°C.
- Срок хранения - 24 месяца со дня изготовления.



Упаковка

Добавку выпускают расфасованной по 0,1; 1 и 5 кг в полимерные контейнеры, по 0,1; 10; 15; 20 и 25 кг во влагонепроницаемые бумажные мешки с полимерным напылением или многослойные бумажные мешки с полиэтиленовым вкладышем, по 200; 500 и 1000 кг в биг-бэги.

Антиоксидант



РЕНДОКС ПЛЮС жидкий RENDOX PLUS liquid



РЕНДОКС ПЛЮС жидкий – кормовая добавка для предотвращения окисления жиров и жирорастворимых витаминов в кормовом сырье и комбикормах для сельскохозяйственных животных, в том числе птиц.



Характеристики

- Синтетический антиоксидант.
- Высокая эффективность достигается наличием активных ингредиентов.



Действующие вещества

Этоксиквин, бутилгидроксанизол, бутилгидрокситолуол, пропил-галлат, лимонная кислота, пропионовая кислота.



Биологические свойства

- РЕНДОКС ПЛЮС жидкий действует как смесь антиоксидантов.
- Предохраняет жиры, жирорастворимые витамины, каротин в составе кормового сырья от окисления. Имеет более широкий спектр действия и эффективность, чем отдельные, входящие в его состав компоненты.
- Позволяет предотвратить потери качества животных жиров, растительных масел, мясокостной муки, рыбной муки, готовых комбикормов вследствие окисления жиров и, следовательно, повысить длительность хранения кормового сырья, снизить затраты корма, повысить продуктивность животных.
- Не теряет активности после термической обработки корма.



Порядок применения

- Норма ввода составляет не менее 125 г/тонну.



Хранение

- Хранить в упаковке производителя в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте при температуре от 0 °С до 30 °С.
- Срок хранения – 24 месяца со дня изготовления.



Упаковка

РЕНДОКС ПЛЮС жидкий выпускают в форме раствора, расфасованного по 1 и 5 л в полимерные бутылки, по 10, 15, 20, 25 л в полимерные канистры, по 100, 200 л в полимерные бочки, по 500 и 1000 л в полимерные емкости соответствующей вместимости.

Антиоксидант



ТЕРМОКС® сухой FG – кормовая добавка для предотвращения окисления жиров в кормовом сырье и комбикормах для сельскохозяйственных животных и птиц, собак и кошек.

**Характеристики**

- Синтетический антиоксидант.
- Высокая эффективность достигается наличием активных ингредиентов.
- Не содержит этоксиквин.

**Действующие вещества**

Бутилгидроксанизол, бутилгидрокситолуол, лимонная кислота.

**Биологические свойства**

- ТЕРМОКС® сухой FG действует как смесь антиоксидантов. Предохраняет жиры, жирорастворимые витамины, каротин в составе кормового сырья от окисления. Имеет более широкий спектр действия и эффективность, чем отдельные, входящие в его состав компоненты.
- Позволяет предотвратить потери качества животных жиров, растительных масел, мясокостной муки, рыбной муки, готовых комбикормов вследствие окисления жиров и, следовательно, повысить длительность хранения кормового сырья, повысить продуктивность животных.
- Не теряет активности после термической обработки корма.

**Порядок применения**

- Норма ввода составляет не менее 125 г/тонну сырья или корма.

**Хранение**

- Хранить в упаковке производителя в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте при температуре от 0 °С до 30 °С.
- Срок хранения – 24 месяца со дня изготовления.

**Упаковка**

ТЕРМОКС® сухой FG выпускают расфасованным по 25 кг во влагонепроницаемые бумажные мешки с полиэтиленовым вкладышем.

Антиоксидант



ТЕРМОКС® жидкий FG TERMOX® liquid FG



ТЕРМОКС® жидкий FG – стабилизированная многокомпонентная кормовая добавка для предотвращения окисления жиров в кормовом сырье и комбикормах для сельскохозяйственных животных и птиц, собак и кошек.



Характеристики

- Синтетический антиоксидант.
- Высокая эффективность достигается наличием активных ингредиентов.
- Не содержит этоксиквин.



Действующие вещества

Бутилгидроксианизол, бутилгидрокситолуол.



Биологические свойства

- ТЕРМОКС® жидкий FG действует как смесь антиоксидантов.
- Предохраняет жиры, жирорастворимые витамины, каротин в составе кормового сырья от окисления. Имеет более широкий спектр действия и эффективность, чем отдельные, входящие в его состав компоненты.
- Позволяет предотвратить потери качества животных жиров, растительных масел, мясокостной муки, рыбной муки, готовых комбикормов вследствие окисления жиров и, следовательно, повысить длительность хранения кормового сырья, повысить продуктивность животных.
- Не теряет активности после термической обработки корма.



Порядок применения

- Норма ввода составляет не менее 125 г/тону сырья или корма.



Хранение

- Хранить в упаковке производителя в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте при температуре от 0 °С до 30 °С.
- Срок хранения – 24 месяца со дня изготовления.



Упаковка

ТЕРМОКС® жидкий FG выпускают расфасованным по 25, 200 и 1000 кг в пластиковые контейнеры.

Антиоксидант



ЭНДОКС® Д сухой – кормовая добавка для предотвращения окисления жиров и жирорастворимых витаминов в кормовом сырье и комбикормах для сельскохозяйственных животных и птиц.

**Характеристики**

- Синтетический антиоксидант.
- Высокая эффективность достигается наличием активных ингредиентов и низкого уровня этоксиквина.

**Действующие вещества**

Бутилгидрокситолуол, этоксиквин, лимонная кислота, фосфорная кислота.

**Биологические свойства**

- ЭНДОКС® Д сухой действует как смесь антиоксидантов. Предохраняет жиры, жирорастворимые витамины, каротин в составе кормового сырья от окисления. Имеет более широкий спектр действия и эффективность, чем отдельные, входящие в его состав компоненты.
- Позволяет предотвратить потери качества животных жиров, растительных масел, мясокостной муки, рыбной муки, готовых комбикормов вследствие окисления жиров и, следовательно, повысить длительность хранения кормового сырья, повысить продуктивность животных.
- Не теряет активности после термической обработки корма.

**Порядок применения**

- Норма ввода составляет не менее 125 г/тонну комбикорма или кормового сырья.

**Хранение**

- Хранить в упаковке производителя в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте при температуре от 0 °С до 30 °С.
- Срок хранения – 24 месяца со дня изготовления.

**Упаковка**

ЭНДОКС® Д сухой выпускают расфасованным по 1 и 5 кг в полимерные контейнеры, по 10, 15, 20 и 25 кг во влагонепроницаемые бумажные мешки с полимерным напылением или с полиэтиленовым вкладышем и биг-бэги по 500, 1000 кг.

Антиоксидант



ЭНДОКС® МЕ сухой – кормовая добавка для предотвращения окисления жиров и жирорастворимых витаминов в кормовом сырье и комбикормах для сельскохозяйственных животных и птиц.

**Характеристики**

- Синтетический антиоксидант.
- Высокая эффективность достигается наличием активных ингредиентов и низкого уровня этоксиквина.

**Действующие вещества**

Бутилгидрокситолуол, этоксиквин, лимонная кислота, фосфорная кислота.

**Биологические свойства**

- ЭНДОКС® МЕ сухой действует как смесь антиоксидантов. Предохраняет жиры, жирорастворимые витамины, каротин в составе кормового сырья от окисления. Имеет более широкий спектр действия и эффективность, чем отдельные, входящие в его состав компоненты.
- Позволяет предотвратить потери качества животных жиров, растительных масел, мясокостной муки, рыбной муки, готовых комбикормов вследствие окисления жиров и, следовательно, повысить длительность хранения кормового сырья, повысить продуктивность животных.

**Порядок применения**

- Норма ввода составляет не менее 125 г/тону комбикорма или кормового сырья.

**Хранение**

- Хранить в упаковке производителя в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте при температуре от 0 °С до 30 °С.
- Срок хранения – 24 месяца со дня изготовления.

**Упаковка**

ЭНДОКС® МЕ сухой выпускают расфасованным по 1 и 5 кг в полимерные контейнеры, по 10, 15, 20 и 25 кг во влагонепроницаемые бумажные мешки с полимерным напылением или многослойные бумажные мешки с полиэтиленовым вкладышем, и по 500, 900, 1000 кг в биг-бэги.

Антиоксидант



Парадаймокс Уайт жидкий Paradymox White liquid



Парадаймокс Уайт жидкий – кормовая добавка для предотвращения окисления жиров в растительных маслах, животных жирах и рыбьем жире для сельскохозяйственных животных и птиц.



Характеристики

- Синтетический антиоксидант.
- Синергический микс полярных и неполярных активных молекул.
- Замедляет процесс окисления.
- Эффективен в низких концентрациях.
- Активные ингредиенты, действующие в разных субстратах.
- Удобен в применении.



Действующие вещества

Пропилгаллат, бутилгидрокситолуол, лимонная кислота.



Биологические свойства

- Парадаймокс Уайт жидкий действует как смесь полярных и неполярных антиоксидантов. Имеет более широкий спектр действия и эффективность, чем отдельные, входящие в его состав компоненты.
- Позволяет предотвратить потери качества животных жиров, растительных масел, мясокостной муки, рыбной муки, готовых комбикормов вследствие окисления жиров и, следовательно, повысить длительность хранения кормового сырья.
- Действующие вещества нанесены на носитель, который дает максимальную площадь активной поверхности.



Порядок применения

Норма ввода составляет в зависимости от типа жира и стабильности:

- животные жиры: 100 - 500 г/т
- растительные масла: 200 - 600 г/т
- рыбий жир: 400 - 1000 г/т



Хранение

- Хранить в упаковке производителя в защищенном от прямых солнечных лучей месте, при температуре от 0°C до 30°C и относительной влажности не более 75%.
- Срок хранения – 24 месяца со дня изготовления.



Упаковка

Парадаймокс Уайт жидкий выпускают расфасованным по 1, 5, 10, 25, 100, 200, 500, 900 и 1000 кг в полимерные контейнеры.

Антиоксидант



Парадаймокс Уайт сухой – кормовая добавка для предотвращения окисления жиров в кормовом сырье и кормах для сельскохозяйственных животных и птиц.

**Характеристики**

- Синтетический антиоксидант.
- Синергический микс полярных и аполярных активных молекул.
- Замедляет процесс окисления.
- Эффективен в низких концентрациях.
- Активные ингредиенты, действующие в разных субстратах.
- Удобен в применении.

**Действующие вещества**

Пропилгаллат, бутилгидрокситолуол, лимонная кислота.

**Биологические свойства**

- Парадаймокс Уайт сухой действует как смесь полярных и неполярных антиоксидантов. Имеет более широкий спектр действия и эффективность, чем отдельные, входящие в его состав компоненты.
- Позволяет предотвратить потери качества животных жиров, растительных масел, мясокостной муки, рыбной муки, готовых комбикормов вследствие окисления жиров и, следовательно, повысить длительность хранения кормового сырья.
- Действующие вещества нанесены на носитель, который дает максимальную площадь активной поверхности.

**Порядок применения**

- Норма ввода составляет не менее 20 г/тону и не более 1000 г/тону корма или кормового сырья в зависимости от степени окисления.

**Хранение**

- Хранить в упаковке производителя в защищенном от прямых солнечных лучей месте, при температуре от 0°C до 30°C и относительной влажности не более 75%.
- Срок хранения – 24 месяца со дня изготовления.

**Упаковка**

Парадаймокс Уайт сухой выпускают расфасованным по 1 и 5 кг в полимерные контейнеры, по 10, 15, 20 и 25 кг во влагонепроницаемые бумажные мешки с полимерным напылением или многослойные бумажные мешки с полиэтиленовым вкладышем, по 500, 900, 1000 кг в биг-бэги.

Антиоксидант



Парадаймокс Уайт DN сухой Paradigmox White DN dry



Парадаймокс Уайт DN сухой – кормовая добавка для предотвращения окисления жиров в кормовом сырье и кормах для сельскохозяйственных животных и птиц.



Характеристики

- Синтетический антиоксидант.
- Комбинация полярных и аполярных активных молекул, обладающих синергическим действием.
- Замедляет процесс окисления.
- Эффективен в низких концентрациях.
- Активные ингредиенты, действующие в разных субстратах, включая комбикорма.
- Удобен в применении.



Действующие вещества

Пропилгаллат, бутилгидрокситолуол, лимонная кислота.



Биологические свойства

- Парадаймокс Уайт DN сухой действует как смесь полярных и неполярных антиоксидантов. Имеет более широкий спектр действия и эффективность, чем отдельные, входящие в его состав компоненты.
- Позволяет предотвратить потери качества животных жиров, растительных масел, мясокостной муки, рыбной муки, готовых комбикормов вследствие окисления жиров и, следовательно, повысить длительность хранения кормового сырья.
- Действующие вещества нанесены на носитель, который дает максимальную площадь активной поверхности.



Порядок применения

- Норма ввода составляет 100 г/тону комбикорма или кормового сырья.



Хранение

- Хранить в упаковке производителя в защищенном от прямых солнечных лучей месте, при температуре от 0°C до 30°C и относительной влажности не более 75%.
- Срок хранения – 24 месяца со дня изготовления.



Упаковка

Парадаймокс Уайт DN сухой выпускают по 1 и 5 кг в полимерные контейнеры, по 10, 15, 20 и 25 кг во влагонепроницаемые бумажные мешки с полимерным напылением или многослойные бумажные мешки с полиэтиленовым вкладышем, по 500, 900, 1000 кг в биг-бэги.

Противомикробная добавка

ФормаКСОЛ®
FormaXOL®



ФормаКСОЛ® – кормовая добавка для подавления патогенной микрофлоры в желудочно-кишечном тракте свиней и сельскохозяйственной птицы.

**Характеристики**

- Синергическое сочетание противомикробных компонентов под одной оболочкой.
- Источник защищенной муравьиной кислоты.
- Постепенное и продолжительное высвобождение активных ингредиентов по желудочно-кишечному тракту.
- Продукт прост и безопасен в обращении.
- Продукт стабилен в кормах, премиксах и в процессе производства кормов. Не летучий.

**Действующие вещества**

Формиат кальция, лимонная кислота, смесь ароматических компонентов, гидрогенизированные растительные жиры, мальтодекстрин, растительные волокна, желатин, крахмал.

**Биологические свойства**

- В состав добавки ФормаКСОЛ® включены органические кислоты и их соли, а также смесь ароматических компонентов, благодаря синергетическому действию которых, кормовая добавка обладает выраженными антибактериальными свойствами в отношении различных видов патогенных и условно патогенных микроорганизмов (сальмонелл, кишечной палочки, и пр.)
- Специальная технология инкапсулирования ингредиентов добавки ФормаКСОЛ® позволяет им без потерь проходить верхние отделы желудочно-кишечного тракта и активно действовать непосредственно в кишечнике.
- Не подавляет рост полезной микрофлоры кишечника.

**Порядок применения**

- Норма ввода 2-4 кг/т корма.

**Хранение**

- Хранить в упаковке производителя в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте при температуре от 0 °С до 30 °С.
- Срок хранения – 18 месяцев со дня изготовления.

**Упаковка**

ФормаКСОЛ® выпускают расфасованным по 25 кг во влагонепроницаемые бумажные мешки с полимерным напылением.

Противомикробная добавка

Формил® 2В сухой
Formyl® 2B dry

Формил® 2В сухой – добавка кормовая для снижения уровня условно-патогенной и патогенной микрофлоры в желудочно-кишечном тракте свиней на откорме, поросят и сельскохозяйственной птицы.



Характеристики

- Технология инкапсулирования обеспечивает действие активных компонентов непосредственно в кишечнике.
- Активные компоненты ингибируют развитие условно-патогенных и патогенных бактерий (сальмонелла, кишечная палочка и др.).
- Является дополнительным источником кальция.



Действующие вещества

Формиат кальция, лимонная кислота, бензойная кислота.



Биологические свойства

- Органические кислоты, входящие в состав кормовой добавки, снижают уровень pH в желудочно-кишечном тракте свиней и сельскохозяйственной птицы, что приводит к ингибированию развития условно-патогенных и патогенных бактерий (сальмонелл, кишечной палочки и др.).
- Технология гранулирования кормовой добавки позволяет ей без изменения проходить верхние отделы желудочно-кишечного тракта и проявлять свое действие непосредственно в кишечнике.
- Кальциевая соль муравьиной кислоты является дополнительным источником кальция.
- Применение добавки с кормом способствует повышению продуктивности свиней и сельскохозяйственной птицы, снижает смертность, улучшает конверсию корма.



Порядок применения

Норма ввода составляет:

- для свиней на откорме и поросят: 2,0 - 3,0 кг/т корма;
- для кур-несушек, бройлеров и индеек: 1,0 - 4,5 кг/т корма.



Хранение

- Хранить в плотно закрытой упаковке производителя в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей, хорошо проветриваемом месте при температуре от 0°C до 30°C.
- Срок хранения – 18 месяцев со дня изготовления.



Упаковка

Формил® 2В сухой выпускают расфасованным по 1, 5 и 25 кг во влагонепроницаемые бумажные мешки с полимерным вкладышем.

Безопасность сырья и кормов



Мико КАРБ® сухой – кормовая добавка для предотвращения роста плесневых грибов в кормовом сырье и кормах для сельскохозяйственных животных, в том числе птиц.

**Характеристики**

- Сбалансированный синергетический комплекс органических кислот и солей для обеспечения мощного эффекта ингибирования плесневых грибов.
- Удобен в использовании. Благодаря уровню pH, близкому к нейтральному, безопасен для персонала, работающего с ним.
- Эффективен при малых нормах ввода.

**Действующие вещества**

Пропионат кальция, фумаровая кислота, сорбиновая кислота.

**Биологические свойства**

- В состав добавки включены органические кислоты и их соли. Благодаря этому Мико КАРБ® сухой препятствует росту и размножению плесневых грибов в кормовом сырье и комбикормах в период хранения, предотвращает накопление в них микотоксинов, способствует сохранению питательной ценности кормов.
- Ингредиенты добавки Мико КАРБ® сухой после внесения в корм не испаряются и обеспечивают его длительную защиту от заражения плесневыми грибами и микотоксинами.

**Порядок применения**

- Норма ввода составляет 0,5-1,0 кг/т корма или кормового сырья.

**Хранение**

- Хранить в упаковке производителя в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте при температуре от 0 °С до 30 °С.
- Срок хранения – 24 месяца со дня изготовления.

**Упаковка**

Мико КАРБ® сухой выпускают расфасованным по 1 и 5 кг в полимерные контейнеры, по 10, 15, 20 и 25 кг во влагонепроницаемые бумажные мешки с полимерным напылением или полиэтиленовым вкладышем, по 500, 1000 кг в биг-бэги.

Безопасность сырья и кормов



Мико КАРБ® жидкий Mycos CURB® liquid



Мико КАРБ® жидкий – кормовая добавка для предотвращения роста плесневых грибов в кормовом сырье и кормах для сельскохозяйственных животных, в том числе птиц.



Характеристики

- Сбалансированный синергетический комплекс органических кислот и солей для обеспечения мощного эффекта ингибирования плесневых грибов.
- Удобен в использовании. Благодаря уровню pH, близкому к нейтральному, безопасен для персонала, работающего с ним.
- Эффективен при малых нормах ввода.



Действующие вещества

Пропионовая кислота, ортофосфорная кислота, сорбиновая кислота.



Биологические свойства

- Мико КАРБ® жидкий препятствует росту и размножению плесневых грибов в кормовом сырье, в том числе зерне с высокой влажностью (выше 14%), и комбикормах в период хранения, предотвращает накопление в них микотоксинов, способствует сохранению питательной ценности корма. Эффективен против широкого спектра плесневых грибов (*Aspergillus*, *Penicillium*, *Fusarium*, *Mucor*, *Alternaria* и др.).
- После внесения в корм и кормовое сырье добавка не испаряется и обеспечивает длительную защиту от заражения плесневыми грибами и микотоксинами.



Порядок применения

- Норма ввода в корм и зерно с влажностью до 14% – 0,5-1,0 кг/т корма.
- Норма ввода в зерно с влажностью 14-16% – 1,0-3,0 кг/т зерна.
- Норма ввода в зерно с влажностью 16-18% – 3,0-6,0 кг/т зерна.



Хранение

- Хранить в упаковке производителя в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте при температуре от 0 °C до 30 °C.
- Срок хранения – 24 месяца со дня изготовления.



Упаковка

Мико КАРБ® жидкий выпускают расфасованным по 1, 5, 10, 15, 20, 25, 100, 200, 500 и 1000 кг в пластиковые контейнеры.

Безопасность сырья и кормов



Сал КАРБ® сухой – добавка кормовая для снижения уровня патогенной микрофлоры в кормовом сырье и кормах для сельскохозяйственных животных, в том числе птиц.

Характеристики

- Сбалансированный синергетический комплекс антибактериальных соединений.
- Широкий спектр действия против патогенов.

Действующие вещества

Пропионовая кислота, муравьиная кислота, сорбиновая кислота, бутилгидроксанизол.



Биологические свойства

- В состав добавки Сал КАРБ® сухой включены органические кислоты и их кальциевые и аммонийные соли, благодаря которым добавка обладает антибактериальными свойствами в отношении различных видов патогенных бактерий (сальмонелл, кишечной палочки, клостридий).
- Ингредиенты добавки не испаряются после внесения в корм и кормовое сырье, обеспечивая длительную защиту от повторного заражения, сохраняют качество и питательную ценность корма.
- Использование свободных от патогенной микрофлоры кормов способствует повышению резистентности к инфекциям, увеличению сохранности, роста и продуктивности животных, в том числе птиц.



Порядок применения

- Норма ввода составляет 1-3 кг/т кормового сырья или комбикорма.



Хранение

- Хранить в упаковке производителя в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте при температуре от 0 °С до 30 °С.
- Срок хранения – 24 месяца со дня изготовления.



Упаковка

Сал КАРБ® сухой выпускают расфасованным по 1 и 5 кг в полимерные контейнеры, по 10, 15, 20 и 25 кг во влагонепроницаемые бумажные мешки с полимерным вкладышем или полимерным напылением и по 500, 1000 кг в биг-бэги.

Безопасность сырья и кормов

Сал КАРБ® K2 сухой
Sal CURB® K2 dry

Сал КАРБ® K2 сухой – кормовая добавка для снижения уровня патогенной микрофлоры в кормовом сырье и кормах для свиней и сельскохозяйственной птицы.

 Характеристики

- Кормовая добавка совместима со всеми ингредиентами кормов, лекарственными препаратами и другими кормовыми добавками.
- Оснований для установления ограничений по использованию продукции животного происхождения при применении Сал КАРБ® K2 сухой не выявлено.

 Действующие вещества

Муравьиная кислота, пропионовая кислота, молочная кислота.

**Биологические свойства**

- Органические кислоты и их аммонийные соли, включенные в состав кормовой добавки Сал КАРБ® K2 сухой, обладают антибактериальными свойствами, угнетают рост и препятствуют размножению таких патогенных микроорганизмов, как сальмонеллы и кишечные палочки в корме и кормовом сырье. Компоненты кормовой добавки обеспечивают длительную защиту от повторного заражения, сохраняют качество и питательную ценность корма.
- Использование свободных от патогенной микрофлоры кормового сырья и кормов способствует улучшению здоровья, увеличению сохранности и продуктивности животных.

**Порядок применения**

- В корма для свиней и сельскохозяйственной птицы, кормовое сырье (мясокостная мука, рыбная мука, соевый шрот, растительная смесь) в зависимости от микробиологической обсемененности - 0,5 - 5,0 кг/т. Кормовую добавку вводят в корма и кормовое сырье на комбикормовых заводах или в кормоцехах хозяйств, используя существующие технологии смешивания.

**Хранение**

- Хранить в упаковке производителя в защищенном от прямых солнечных лучей месте, при температуре от 0°C до 30°C и относительной влажности не более 75%.
- Срок хранения – 24 месяца со дня изготовления.

**Упаковка**

Сал КАРБ® K2 сухой выпускают по 1 кг и 5 кг в полимерных контейнерах, по 10 кг, 15 кг, 20 кг и 25 кг во влагонепроницаемых бумажных мешках с полимерным вкладышем или полимерным напылением по 500 кг, 800 кг, 900 кг и 1000 кг в биг-бэгах.

Безопасность сырья и кормов



Сал KARB® K2 жидкий Sal CURB® K2 liquid



Сал KARB® K2 жидкий – добавка кормовая для снижения уровня патогенной микрофлоры в воде для поения, кормовом сырье и кормах для свиней и сельскохозяйственной птицы.

Характеристики

- Антибактериальный продукт для использования в сырье, готовых кормах и питьевой воде.
- Синергический комплекс муравьиной, молочной и пропионовой кислоты, их солей и поверхностно-активного вещества.

Действующие вещества

Муравьиная кислота, пропионат аммония и молочная кислота.



Биологические свойства

- В состав добавки Сал KARB® K2 жидкий включены органические кислоты и их аммонийные соли, благодаря которым добавка обладает антибактериальными свойствами, угнетает рост и препятствует размножению таких патогенных микроорганизмов, как сальмонеллы и кишечные палочки в корме, кормовом сырье и воде для поения.
- Ингредиенты добавки не испаряются после внесения, обеспечивая длительную защиту от повторного заражения, сохраняют качество и питательную ценность корма.
- Использование свободных от патогенной микрофлоры кормового сырья, кормов и воды для поения способствует улучшению здоровья, увеличению сохранности и продуктивности животных.



Порядок применения

- Норма ввода составляет 1,0-5,0 кг/т кормового сырья или корма в зависимости от микробиологической обсемененности и предполагаемых сроков хранения.
- Норма ввода составляет 0,1-0,5 кг/т воды.



Хранение

- Хранить в упаковке производителя в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте при температуре от 0 °С до 30 °С.
- Срок хранения – 24 месяца со дня изготовления.



Упаковка

Сал KARB® K2 жидкий выпускают расфасованным по 1, 5, 25, 200 и 1000 кг в пластиковые контейнеры.

Безопасность сырья и кормов



Сал КАРБ® Ва жидкий Sal CURB® Ba liquid



Сал КАРБ® Ва жидкий – добавка кормовая для снижения уровня патогенной микрофлоры в воде для поения, кормовом сырье и кормах для свиней и сельскохозяйственных птиц.

Характеристики

- Антибактериальный продукт для использования в сырье, готовых кормах и питьевой воде.
- Синергический комплекс муравьиной, молочной и пропионовой кислоты, их солей и поверхностно-активных веществ.
- Повышенное содержание сурфактантов.

Действующие вещества

Муравьиная кислота, формиат аммония, пропионовая кислота, молочная кислота



Биологические свойства

- Входящие в состав Сал КАРБ Ва жидкий муравьиная кислота, формиат аммония, пропионовая кислота и молочная кислоты обладают антибактериальными свойствами, препятствуют размножению различных видов патогенных и условно-патогенных бактерий (сальмонелл, кишечной палочки, листерий, кампилобактерий) в воде для поения и в кормах.
- Ингредиенты не испаряются после внесения, благодаря чему обеспечивают длительную защиту от повторного заражения, сохраняют качество и питательную ценность кормов и воды, а также обладают антикоррозийным действием на оборудование.



Порядок применения

- Нормы ввода добавки: в кормовое сырье (корма животного и растительного происхождения, шроты) 0,75-5,0 кг/т корма;
- в корма для кур-несушек, цыплят бройлеров, индеек товарного стада 0,75-5,0 кг/т корма;
- свиноматкам с 90-114 дня супоросности до отъема поросят 0,75-5,0 кг/т корма;
- свиньям на откорме 0,75-5,0 кг/т корма.



Хранение

- Хранят в упаковке производителя в защищенном от прямых солнечных лучей месте при температуре от 0°C до 30°C и относительной влажности не более 75%.
- Срок хранения - 24 месяца со дня изготовления.



Упаковка

Выпускают расфасованной по 1, 5, 25, 200, 500, 900 и 1000 кг в полимерные контейнеры.

Безопасность сырья и кормов



Сал КАРБ® жидкий
Sal CURB® жидкий



Сал КАРБ® жидкий – добавка кормовая для снижения уровня патогенной микрофлоры в кормовом сырье и кормах для сельскохозяйственных животных, в том числе птиц.

**Характеристики**

- Сбалансированный синергетический комплекс антибактериальных соединений.
- Широкий спектр действия против патогенов.

**Действующие вещества**

Пропионовая кислота, муравьиная кислота, сорбиновая кислота, фосфорная кислота.

**Биологические свойства**

- В состав добавки Сал КАРБ® жидкий включены органические кислоты и их соли, благодаря которым добавка обладает антибактериальными свойствами в отношении различных видов патогенных бактерий (сальмонелл, кишечной палочки, клостридий).
- Ингредиенты добавки не испаряются после внесения в корм и кормовое сырье, обеспечивая длительную защиту от повторного заражения, сохраняют качество и питательную ценность корма.
- Использование свободных от патогенной микрофлоры кормов способствует повышению резистентности к инфекциям, увеличению сохранности, роста и продуктивности животных, в том числе птиц.

**Порядок применения**

- Норма ввода составляет 1-3 кг/т кормового сырья или комбикорма и 0,5-1 кг/т воды для поения.

**Хранение**

- Хранить в упаковке производителя в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте при температуре от 0 °С до 30 °С.
- Срок хранения – 24 месяца со дня изготовления.

**Упаковка**

Сал КАРБ® жидкий выпускают расфасованным по 1, 5, 10, 15, 20, 25, 100, 200, 500 и 1000 кг в полимерные контейнеры.

Безопасность сырья и кормов



KEM BET Амп жидкий KEM WET Amp liquid



KEM BET Амп жидкий (KEM WET Amp liquid) – добавка для улучшения качества гранулированных кормов для сельскохозяйственных животных, в том числе птиц, за счет снижения уровня патогенной микрофлоры, повышения влагоудерживающей способности гранул и их крепости.



Характеристики

- Концентрированный состав для применения в малых дозах.
- Комбинация поверхностно-активных веществ для равномерного распределения жиров и влаги.
- Близкий к нейтральному pH – для более безопасного использования.



Действующие вещества

Пропионовая кислота (в свободной форме и в виде соли аммония) и вспомогательные вещества, в том числе эмульгаторы: пропиленгликоль и глицерил полиэтиленгликоль рицинолеат.



Биологические свойства

- Пропиленгликоль и глицерил полиэтиленгликоль рицинолеат являются эмульгаторами, снижающими поверхностно-активное натяжение, в результате чего влага, жиры распределяются в частицах корма, обеспечивая лучшее молекулярное сцепление в процессе гранулирования.
- Благодаря использованию добавки улучшается эффективность производства гранулированных комбикормов (снижаются энергозатраты, связанные с гранулированием, увеличивается производительность гранулятора и крепость гранул) и их качество, что в комплексе приводит к повышению эффективности использования кормов животными, снижению конверсии корма, повышению сохранности и продуктивности животных.



Порядок применения

- Добавку вносят на комбикормовых заводах и в кормоцехах хозяйств при гранулировании кормов путем подачи с помощью автоматических устройств в смеситель увлажняющего раствора.
- Норма ввода добавки 100- 400 г/т корма.



Хранение

- Хранить в упаковке производителя в плотно закрытой таре, в защищенном от прямых солнечных лучей и влаги месте при температуре от минус 10°C до 30°C.
- Срок хранения – 24 месяца со дня изготовления при соблюдении условий хранения.



Упаковка

Выпускают расфасованной по 1, 5, 10, 15, 20, 25, 100, 200, 500, 900 и 1000 кг в полимерные флаконы, канистры, бочки или контейнеры.

Безопасность сырья и кормов



ПроОксайн АН ProOxine АН



ПроОксайн АН (ProOxine АН) – кормовая добавка для снижения уровня патогенной микрофлоры в воде для поения сельскохозяйственных животных, в том числе птиц.



Характеристики

- ПроОксайн АН совместим со всеми ингредиентами кормов и другими кормовыми добавками.
- Оснований для установления ограничений использования продукции животного происхождения не выявлено.



Действующие вещества

хлорит натрия (NaClO_2) – 7,9-8,8%;
вспомогательное вещество – вода.



Биологические свойства

- После активации хлорита натрия лимонной кислотой выделяется диоксид хлора, который обладает антимикробной активностью широкого спектра действия и препятствует размножению различных видов патогенных и условно-патогенных бактерий (сальмонелл, кишечной палочки, кампилобактерий), а также бактерий и грибов, образующих биопленки. Использование свободной от патогенной микрофлоры воды поддерживает здоровье и способствует повышению привесов и продуктивности.



Порядок применения

- Для сельскохозяйственных животных, в том числе птиц, применяют активированный рабочий раствор с содержанием диоксида хлора (ClO_2) 3-5 мг/кг воды в зависимости от микробиологической обсеменённости. Кормовая добавка перед применением предполагает активацию лимонной кислотой с последующим добавлением в воду для получения рабочего раствора.



Хранение

- Хранить в упаковке производителя в защищенном от прямых солнечных лучей месте при температуре от 0°C до 30°C и относительной влажности воздуха не более 75%.
- Срок хранения – 12 месяцев с даты производства.



Упаковка

ПроОксайн АН выпускают расфасованным по 20 кг, 120 кг, 221 кг в полиэтиленовые бочки и по 1325 кг в полимерные контейнеры IBC.

Адсорбенты микотоксинов

ТОКСФИН сухой
TOXFIN dry

ТОКСФИН сухой – кормовая добавка для адсорбции афлатоксина В1 в кормах для сельскохозяйственных животных, в том числе птиц.



Характеристики

- Адсорбция широкого спектра микотоксинов.
- Отсутствие отрицательного влияния на доступность питательных веществ.
- Отсутствие эффекта стимулятора роста.
- Положительное влияние на зоотехнические показатели.
- Восстановление статуса органов-мишеней микотоксинов.
- Выделение микотоксинов с пометом.
- Поддержание иммунного статуса в присутствии микотоксинов в корме.



Действующие вещества

Бентонит-монтмориллонит, сепиолит.



Биологические свойства

- ТОКСФИН сухой эффективно адсорбирует афлатоксин В1, препятствуя его всасыванию в желудочно-кишечном тракте животных и птиц, смягчает последствия микотоксикоза, предотвращает попадание афлатоксина В1 в мясо, молоко, яйца, обеспечивает их экологическую безопасность.
- Адсорбирующие свойства сохраняются после термической обработки кормов.



Порядок применения

- Норма ввода для свиней и птиц составляет 1-5 кг/т корма.



Хранение

- Хранить в упаковке производителя в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте при температуре от 0 °С до 37 °С.
- Срок хранения – 24 месяца со дня изготовления.



Упаковка

ТОКСФИН сухой выпускают расфасованным по 1 и 5 кг в полимерные контейнеры, по 10, 15, 20 и 25 кг во влагонепроницаемые бумажные мешки с полимерным напылением или многослойные бумажные мешки с полиэтиленовым вкладышем и по 500 и 1000 кг в биг-бэги.

Адсорбенты микотоксинов

ТОКСФИН 2.0 сухой
TOXFIN 2.0 dry

ТОКСФИН 2.0 сухой – кормовая добавка, предназначенная для адсорбции микотоксинов в кормах для сельскохозяйственных животных и птиц. Усиленная формула с повышенной эффективностью связывания микотоксинов широкого спектра, для предотвращения микотоксикозов у сельскохозяйственных животных и птиц.

**Характеристики**

- Сочетание нескольких адсорбирующих компонентов.
- Ингредиенты обрабатываются для обеспечения эффективного и специфичного связывания.
- Содержит специальный бентонит, включенный ЕС в список ингредиентов для связывания микотоксинов.
- Запатентованное применение.
- Неперевариваемый, стабильный и активный во всем желудочно-кишечном тракте.

**Действующие вещества**

Сепиолит, бентонит-монтмориллонит, леонардит.

**Биологические свойства**

- ТОКСФИН 2.0 сухой эффективно адсорбирует микотоксины, содержащиеся в кормах для сельскохозяйственных животных и птиц, препятствуя их всасыванию в желудочно-кишечном тракте.
- ТОКСФИН 2.0 сухой смягчает последствия микотоксикозов, предотвращает попадание микотоксинов в мясо, молоко, яйца, обеспечивает их экологическую безопасность.

**Порядок применения**

- Норма ввода для свиней и птиц составляет 1-3 кг/т корма.

**Хранение**

- Хранить в упаковке производителя в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте при температуре от 0 °С до 37 °С.
- Срок хранения – 24 месяца со дня изготовления.

**Упаковка**

ТОКСФИН 2.0 сухой выпускают расфасованным по 25 кг во влагонепроницаемые бумажные мешки с полиэтиленовым вкладышем или по 1000 кг в биг-бэги.

Адсорбенты микотоксинов



ТОКСФИН XL сухой – кормовая добавка для адсорбции микотоксинов в кормах для сельскохозяйственных животных, в том числе птиц.

**Характеристики**

- Сочетание нескольких адсорбирующих компонентов.
- Сорбционная емкость составляет:
по афлатоксину В1 - не менее 99%, по зеараленону - не менее 88%,
по ократоксину А - не менее 90%, по фумонизину В1 - не менее 99%,
по Т-2 токсину - не менее 76%.
- Неперевариваемый, стабильный и активный во всем желудочно-кишечном тракте.

**Действующие вещества**

сепиолит 46-52%, бентонит 48-54%.

**Биологические свойства**

- ТОКСФИН XL сухой эффективно адсорбирует микотоксины, содержащиеся в кормах, препятствуя их всасыванию в желудочно-кишечном тракте животных и птиц.
- Смягчает последствия микотоксикозов, предотвращает попадание микотоксинов в мясо, молоко, яйца, обеспечивает их экологическую безопасность.
- Адсорбирующие свойства сохраняются после термической обработки кормов.

**Порядок применения**

- Норма ввода для свиней и птиц составляет 1-3 кг/тону комбикорма;
- Для крупного рогатого скота 1-5 кг на тону корма или 20-50 г на голову в сутки.

**Хранение**

- Хранят в упаковке производителя в защищенном от солнечных лучей месте, при температуре от 0 °С до 37 °С и относительной влажности не более 75%.
- Срок хранения – 24 месяца со дня изготовления.

**Упаковка**

Выпускают расфасованным по 0,1, 1 и 5 кг в полимерных контейнерах; по 0,1, 1, 10, 15, 20 и 25 кг во влагонепроницаемые бумажные мешки с полимерным напылением или многослойные бумажные мешки с полиэтиленовым вкладышем низкой плотности или по 200, 500, 1000 кг в биг-бэги.

Контакты Кемин в России:

115114, г. Москва,
Летниковская улица, д. 10 стр. 4, этаж 4, БЦ «Святогор 4»
Тел.: 8 800 25 00 157

398010, Липецкая область, Грязинский муниципальный район,
городское поселение г. Грязи, территория ОЭЗ ППТ «Липецк»,
строение 33, корпус 2
Тел.: 8 4742 50 24 00

Информация по нашим продуктам и решениям:

Support.Russia@kemin.com

По вопросам рекламы и сотрудничества:

Marketing.Russia@kemin.com

Некоторые утверждения могут не распространяться на все географические регионы.
Маркировка продукции и связанные с ней требования могут отличаться в зависимости от государственных требований.

© Кемин Индастриз, Инк. и её группа компаний 2024. Все права защищены.

® ТМ являются торговыми марками Кемин Индастриз Инк., США.

* Compelled by curiosity — Движимые любознательностью.



www.kemin.com/ru-products